Introduction

T. Aparicio

© Springer-Verlag France 2013

Les cancers du côlon non métastatiques représentent 75 % de l'ensemble des cancers coliques. Au sein de ce vaste ensemble de cancer il existe des situations cliniques très différentes :

- Tumeurs débutantes pouvant relever d'un traitement endoscopique selon des critères bien définis. L'analyse de la pièce de résection doit permettre de statuer sur la nécessité d'une reprise chirurgicale ou non,
- Tumeurs de stade II pour lesquels la décision de la chimiothérapie adjuvante doit être discutée au cas par cas, s'appuyant sur des caractéristiques anatomopathologiques tumorales mais également sur des éléments biologiques comme l'existence ou non d'une anomalie de réparation de l'ADN et demain d'autres paramètres biologiques,

- Tumeurs de stade III pour lesquels un consensus de traitement existe, cependant la prise en charge des patients âgés reste un sujet de débat.

La prise en charge chirurgicale des cancers du côlon non métastatiques continue de faire des progrès avec la généralisation de l'abord coelioscopique et la meilleure prise en compte des paramètres nutritionnels préopératoires. Enfin, la conduite de la surveillance après résection carcinologique reste l'objet de controverse. Les écueils étant une surveillance trop intensive avec des examens potentiellement iatrogènes ou une surveillance trop relâchée faisant courir le risque d'une perte de chance en cas de récurrence. L'efficacité médico-économique des programmes de surveillance devrait être évaluée.

Ce dossier thématique doit nous permettre de répondre à ces questions de prise en charge quotidienne.

T. Aparicio (✉)

Secrétaire général de la Fédération francophone de cancérologie digestive, service de gastroentérologie et cancérologie digestive, Hôpital Avicenne, HUPSSD, AHP, 125, rue de Stalingrad, 93000 Bobigny
e-mail : thomas.aparicio@avc.aphp.fr