Introduction

T. Aparicio

© Springer-Verlag France 2014

Bien que l'intestin grêle représente 75% de la longueur du tube digestif et 90% de sa surface muqueuse, les cancers de l'intestin grêle restent rares et représentent moins de 5% des cancers digestifs [1]. Selon les bases de données américaines l'incidence des cancers de l'intestin grêle est passée de 11,8 cas/million en 1973 à 22,7 cas/million en 2004 [2]. De même, en France, l'incidence a augmenté pendant la période 1976-2001 [3]. Quatre types histologiques principaux sont présents dans l'intestin grêle : les adénocarcinomes, les tumeurs neuroendocrines, les tumeurs stromales et les lymphomes.

Les adénocarcinomes de l'intestin grêle sont parmi les quatre types histologiques les tumeurs qui ont le plus mauvais pronostic. Des données récentes ont permis de préciser la proportion des tumeurs survenant dans le cadre de pathologies prédisposantes, le profil moléculaire des tumeurs, le choix des chimiothérapies. Des informations supplémentaires sont attendues grâce à l'analyse de la cohorte NADEGE. Un essai thérapeutique évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d'un adénocarcinome de l'intestin grêle va bientôt démarrer (étude BALLAD). L'évaluation de nouvelles thérapeutiques dans les formes métastatiques n'a jamais été faite.

Les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle sont réputées pour avoir un bon pronostic comparé à d'autres tumeurs digestives. Récemment des essais randomisés ont permis d'établir l'efficacité de plusieurs molécules dans le traitement des formes métastatiques. La recherche clinique est particulièrement dynamique dans cette localisation tumorale qui est rare en incidence mais relativement fréquente en prévalence du fait de la survie prolongée des patients. L'expertise diagnostique apportée par le réseau TENpath et la structuration de la prise en charge des patients par le réseau des RCP RENATEN est exemplaire et permet une prise en charge optimale des patients en France.

Les tumeurs stromales digestives (GIST) sont les tumeurs digestives qui ont connu le bouleversement thérapeutique le plus important au cours de la dernière décennie. Ces tumeurs de mauvais pronostic spontané sont maintenant parmi celles

qui ont le meilleur pronostic en pathologie tumorale digestive. Le progrès décisif est venu de l'identification des mutations du récepteur c-kit à l'origine de la carcinogénèse de ces tumeurs. L'inhibition de ce récepteur par des thérapies ciblées orales permet un contrôle tumoral prolongé. Un traitement adjuvant par l'imatinib réduit le risque de récurrence des GIST à haut risque de récurrence.

Enfin les lymphomes de l'intestin grêle regroupent plusieurs entités anatomocliniques de présentation et de pronostic différents : lymphome B (lymphome diffus à grandes cellules B, lymphomes du manteau, lymphomes folliculaires, lymphome de la zone marginale du MALT, lymphome de Burkitt) et lymphomes T plus rares. Le typage histologique est essentiel, une relecture systématique des lames au sein du réseau Lymphopath est désormais organisée. Le traitement reposera le plus souvent sur une polychimiothérapie associée éventuellement au rituximab mais il peut varier considérablement d'une entité à l'autre. La prise en charge multidisciplinaire impliquant précocement les hématologues est fondamentale.

Les progrès dans l'exploration de l'intestin grêle obtenus grâce à la vidéocapsule endoscopique, l'entéroscopie double ballon et l'entéroscanner permettent de faire des diagnostics précis plus précoces et placent le gastroentérologue au centre de la démarche diagnostique. Ce dossier présente les dernières avancées concernant les tumeurs de l'intestin grêle qui ne sont finalement pas si rares.

Bonne lecture !

Références

1. Neugut AI, Jacobson JS, Suh S, et al (1998) The epidemiology of cancer of the small bowel. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 7:243–51
2. Bilimoria KY, Bentrem DJ, Wayne JD, et al (2009) Small bowel cancer in the United States: changes in epidemiology, treatment, and survival over the last 20 years. *Ann Surg* 249:63–71
3. Lepage C, Bouvier AM, Manfredi S, et al (2006) Incidence and management of primary malignant small bowel cancers: a well-defined French population study. *Am J Gastroenterol* 101:2826–32

T. Aparicio (✉)

Service de gastroentérologie et cancérologie digestive,
hôpital Avicenne, HUPSSD, AHP,
125, rue de Stalingrad, 93000 Bobigny, France
e-mail : thomas.aparicio@avc.aphp.fr