Erratum to: The southernmost record of a Neuryurini Hoffstetter, 1958 (Mammalia, Xenarthra, Glyptodontidae)

Laureano Raúl González Ruiz · Alfredo Eduardo Zurita ·
John Fleagle · Gustavo Juan Scillato-Yané ·
María Teresa Dozo · Martín Zamorano

Published online: 31 July 2011
© Springer-Verlag 2011

Erratum to: *Paläontol Z* (2011) 85:155–161 DOI 10.1007/s12542-010-0083-8

Owing to a technical problem, an uncorrected version of the German abstract was published.

The correct version is supplied here.

Kurzfassung In dieser Arbeit dokumentieren wir das südlichste und vermutlich älteste Vorkommen des Tribus Neuryurini (Glyptodontidae). Das südlichste Vorkommen dieses Tribus ausserhalb Patagoniens ist *Neuryurus* sp. aus Sedimenten Lujanianen Alters (Luján Formation, spätes Pleistozän bis frühes Holozän) am Quequén Grande Fluss (Provinz

Buenos Aires, Argentinien). Der erste und bisher einzige Nachweis der Gruppe aus Patagonien kam aus den oberen Schichten der Puerto Madryn Formation (Huayquerian SALMA, oberes Miozän) auf der Halbinsel Valdés (Provinz Chubut, Argentinien). Das neue, hier beschrieben und als Neuryurini indet. bestimmte Exemplar stammt von der Estancia La Peninsular (Provinz Santa Cruz, Argentinien). Geologische Untersuchungen ordnen diese Fundstelle in die Santa Cruz Formation ein (Santacrucian SALMA, spätes Untermiozän), aber bisher wurden von hier keine Fossilien beschrieben. Somit repräsentiert das neue Exemplar, zusammen mit zwei bestätigten Vorkommen von *Glyptodon* Owen und *Panochthus* Burmeister (beide aus dem Quartär), die einzigen Glyptodontiden, die nicht zu den Propalaeophorinae gehören, aus der Provinz Santa Cruz.

The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s12542-010-0083-8.

L. R. González Ruiz (✉)
Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB), Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” sede Esquel (UNPSJB), Ruta Nacional 259, km 16.5, 9200 Esquel, Chubut, Argentina
e-mail: gonzalezlaureano@yahoo.com.ar

A. E. Zurita
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), y, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Ruta 5, km 2.5 CC, 128 3400 Corrientes, Argentina
e-mail: azurita@cecoal.com.ar

J. Fleagle
Department of Anatomical Sciences, Health Sciences Center, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA
e-mail: jfleagle@notes.cc.sunysb.edu

G. J. Scillato-Yané · M. Zamorano
División Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina
e-mail: scillato@museo.fcnym.unlp.edu.ar

M. Zamorano
e-mail: marzamorano@museo.fcnym.unlp.edu.ar

M. T. Dozo
Laboratorio de Paleontología, UI Diversidad, Sistemática y Evolución, Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina
e-mail: dozo@cenpat.edu.ar

L. R. González Ruiz · A. E. Zurita · G. J. Scillato-Yané ·
M. T. Dozo · M. Zamorano
CONICET, Buenos Aires, Argentina