© Begleiter / Bildagentur-o

Behandlung unter Lachgas

Endlich cool im Stuhl

Bis in die 1960er Jahre gehörte die Betäubung mit Lachgas zum Standard in deutschen Zahnarztpraxen. Schön war die Behandlung damit nicht. Dann kam eine neue Generation von Lokalanästhetika auf den Markt, und die Zahnärzte verbannten das Gas erleichtert aus ihrer Praxis. Nun ist es plötzlich wieder da.

Es war vor etwa acht Jahren, als Dr. Frank G. Mathers das Gefühl bekam, in Arbeit zu ersticken. Immer häufiger klingelte bei dem Kölner Anästhesisten und Schmerztherapeuten das Tele-

fon, weil Zahnärzte dringend für einen Patienten eine Narkose oder zumindest eine Sedierung brauchten. „Ich bin gar nicht mehr nachgekommen und musste dauernd sagen: Nein, ich kann nicht, ich habe so viel zu tun, ich bin schon kurz vorm Herzinfarkt“, erzählt der 57-Jährige. „Und meinen Kollegen ging es nicht anders. Ich kenne keinen Anästhesisten, der nicht sagt: ‚Ich bin fix und fertig‘, weil er überlastet ist.“ Der Bedarf in den Zahnarztpraxen aber war nicht eingebildet. Immer mehr chirurgische Eingriffe, Implantate und Angstpatienten – das Arbeitsfeld hatte sich seit den 90er Jahren gründlich erweitert.

„Da habe ich mir überlegt: Warum führen die Zahnärzte nicht einfach ihre eigenen Sedierungen durch, wie bei uns in Amerika?“, sagt Dr. Mathers. Dazu muss man wissen: Mathers ist Deutsch-Amerikaner. 1959 kam er als Kind einer deutschen Mutter und eines US-Soldaten in Kingston, Pennsylvania, zur

Nicht für jeden geeignet

Nicht bei jedem Patienten ist die Lachgas-Sedierung angeraten. Absolute Kontraindikationen sind kürzlich stattgefundene Augenoperationen mit intraokularem Gas (Vitrektomie), Pneumothorax, Darmverschluss, Drogenabhängigkeit. Abgeraten wird auch bei Kindern unter vier Jahren, Schwangerschaft, Demenz, Sinusitis, Mastoiditis, Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und einigen Formen geistiger Behinderung. (Quelle: Institut für dentale Sedierung)

mm