Nicht invasive optische Diagnostik der Haut

Wie verändert Weltraum-Strahlung die Haut von Astronauten?

Mit einer von Prof. Karsten König entwickelten Lasertechnologie lässt sich in vivo in Hautzellen hineinschauen. Die räumliche Auflösung ist dabei tausendmal höher als bei Ultraschallgeräten.

Knapp 6 Monate verbrachte der deutsche Alexander Gerst 2014 auf der Internationalen Raumstation ISS. Prof. Karsten König untersuchte anschließend mit einem Femtosekundenlaser, wie sich Gersts Haut im Weltall verändert hat. Bei der Analyse von Gersts Haut hat König festgestellt, dass mehr Kollagen gebildet worden ist. „Durch das hat sich die Haut verjüngt“, so König. Zugleich hat sich sowohl der Pigmentfarbstoff Melanin als auch die Epidermis zurückgebildet. „Diese Hautschicht ist um etwa 20 % dünner geworden“, sagte er. Bei

einem italienischen Astronauten waren die Resultate ähnlich. Warum diese Prozesse in der Haut im Weltall ablaufen, ist noch nicht geklärt. „Für längere Aufenthalte im Weltraum, etwa bei einer Expedition zum Mars, wäre es wichtig zu wissen, wie man Astronauten vor der Strahlung aus dem All besser schützen kann“, so König. Bei Gerst hat sich die Haut nach seiner Rückkehr in der Zwischenzeit wieder regeneriert.

Der Femtosekundenlaser spielt auch bei der Krebsfrüherkennung eine Rolle. Damit können direkt einzelne Krebszellen bestimmt werden. Die Technik setzt auf die fluoreszierende Eigenschaft von Krebszellen, die, angeregt durch Laserstrahlen, anders leuchten als gesunde Zellen.

Nach Informationen der Universität des Saarlandes

Melanozytäre Nävi bei Immunsuppression?

Eine Gruppe von Ärzten um Dr. Gamze Koseoglu von der Universität in Ankara hat in einer Studie die Entwicklung von Nävi bei Patienten geprüft, die zur immunsuppressiven Therapie einen Anti-TNF- α -Antikörper, Methotrexat, Azathioprin oder Ciclosporin erhalten hatten.

Sie beurteilten bei 103 Patienten die Entwicklung von insgesamt 266 melanozytären Läsionen. Signifikante Unterschiede bei der Zahl der Nävi stellten die Ärzte nach einem Jahr nur bei einer Antikörpertherapie und einer Behandlung mit Methotrexat oder Azathioprin fest, Ciclosporin hatte keinen Effekt. Der Durchmesser der Nävi hatte sich nur unter der Therapie mit dem Antikörper oder mit Methotrexat signifikant vergrößert. Insgesamt 10 melanozytäre Läsionen wurden exziiert. Alle untersuchten Proben entpuppten sich als benigne. *Peter Leiner*

Koseoglu G et al. J Am Acad Dermatol 2015;73:623–9

Digital Health

Versicherer und Ärzte warnen vor Risiken

Es gibt immer mehr digitale Gesundheitsangebote. Aber noch sind viele Aspekte ungeklärt.

Die Ärzteschaft ist angesichts der zunehmenden Digitalisierung und der Datensammelwut im Gesundheitsbereich gefordert, findet der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Frank Ulrich Montgomery. „Wir müssen die Dinge überprüfen und fragen: Nutzen sie den Patienten?“, so Montgomery beim 15. PKV-Forum des privaten Krankenversicherers Continentale am 8.9.2015 in Köln. Die Ärzte stehen dabei ebenso wie Krankenversicherer und

Politiker vor einer großen Aufgabe. „Wir müssen uns selbst kundig machen und die Patienten, Versicherten und Bürger darüber informieren, welcher Unsinn hinter manchen Angeboten steht“, sagte er. An einer Regulierung führe kein Weg vorbei. Sie sei eine internationale und keine nationale Aufgabe, betonte Montgomery.

Nach Einschätzung des Journalisten Sascha Lobo sind die Krankenversicherer gut beraten, sich rechtzeitig mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, die künftig unter dem Stichwort „Big Data“ und der vermeintlichen Möglichkeit der Risikodifferenzierung auf sie zukommen werden. Der Datenschutz muss gerade unter dem Aspekt der Datensouveränität weiterentwickelt werden. Klar ist für Lobo: „Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der mir meine Zahnputz-App sagt: Wenn Du Dir nicht in zehn Minuten Deine Zähne putzt, dann fliegst Du aus Deiner Zahnzusatzversicherung.“

Ilse Schlingensiepen

Ärzte Zeitung vom 9.9.2015

Erratum zu

„Januskinase-Inhibitor so wirksam wie ein Biologikum. Neue orale Therapieoption bei Psoriasis“ in *ästhetische dermatologie & kosmetologie* 4/2015, Seite 14 von Veronika Schlimpert. Versehentlich wurden die PASI- und PGA-Werte zum Studienende falsch wiedergegeben. Die korrekten Zahlen lauten wie folgt:

Zum Studienende hatte sich bei 39,5 % der Patienten mit der 5-mg- und bei 63,6 % mit der 10-mg-Tofacitinib-Dosis der „Psoriasis Area and Severity“ (PASI)-Score um mindestens 75 % verbessert, mit Etanercept war das bei 58,8 % und mit Placebo bei 5,6 % der Fall. Ein „klares Hautbild“ oder „nahezu klares Hautbild“ im „Physician Global Assessment for Psoriasis“ (PGA)-Score erreichten 47,1 % (Tofacitinib 5 mg), 68,2 % (Tofacitinib 10 mg), 66,3 % (Etanercept) und 15,0 % (Placebo) der Patienten. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Wertvolle Gesundheitsdaten? Einzelne Versicherer liebäugeln schon mit den Infos.