Fracture du plancher de l'orbite

Fracture of the floor of the orbit

C. Petit · N. Thoma

Reçu le 12 juin 2012 ; accepté le 29 août 2012
© SFMU et Springer-Verlag France 2012

Un homme de 21 ans consulte aux urgences, après une agression, pour une douleur péri-orbitaire droite associée à un œdème palpébral supérieur et inférieur. L'examen clinique retrouve un volumineux œdème palpébral à droite sans diplopie, ni trouble de l'oculomotricité ou baisse de l'acuité visuelle ainsi qu'un important emphysème sous-

cutané s'étendant de l'œil droit à la joue homolatérale. Le patient signale une nette majoration de l'œdème suite au mouchage. Le scanner du massif facial met en évidence une fracture du plancher de l'orbite droit avec un hémorosinus associé et un emphysème intra-orbitaire et sous-cutané.

Fig. 1 Tomodensitométrie de massif facial : coupe sagittale (A) et frontale (B) d'une fracture du plancher de l'orbite droit en « blow out » (flèches fines) avec hémorosinus (flèche large) et emphysème sous cutané péri-oculaire et jugal droit (flèches pointillées)

C. Petit (✉) · N. Thoma
Service urgences-Smur, centre hospitalier de Cornouaille,
14, avenue Yves Thépot, F-29000 Quimper, France
e-mail : petit-caroline@hotmail.fr