++ VSOU 2016 +++ VSOU 2016 +++ VSOU 2016 +

Distale Radiusfraktur: Indikationen für die konservative oder operative Versorgung

Zur Frage der Behandlung einer distalen Radiusfraktur bezog Prof. Florian Gebhardt, Zentrum für Chirurgie, Universitätsklinikum Ulm, in der Sitzung „Frakturen bei Osteoporose/Alterstraumatologie“ Stellung: Die konservative Therapie sei bei älteren Patienten mit mittlerem Anspruchsniveau weiterhin eine valide Therapieoption. Es müsse allerdings bedacht werden, dass der Gips Patienten aus dem Gleichgewicht bringen und somit das Sturzrisiko erhöhen könne.

Als osteoporotische Indikatorfraktur ist die distale Radiusfraktur eine häufige

Fraktur. Sie macht 20 % aller Frakturen aus, betrifft in Deutschland mehr als 100.000 Personen pro Jahr; acht von zehn Betroffenen sind älter als 50 Jahre. Das Lebenszeitrisko betrage für Frauen 13, für Männer 2 %, sagte Gebhardt.

In der multizentrischen ORCHID-Studie wurden zwei Strategien bei 185 mindestens 65-jährigen Patienten mit intraartikulärer distaler Radiusfraktur (AO-Typ C) verglichen – die offene Reposition mit anschließender volarer winkelstabiler Plattenosteosynthese (ORIF) und die geschlossene Reposition mit sechswöchiger Gipsstabilisierung.

Das Ergebnis hinsichtlich Beweglichkeit, Funktion und Lebensqualität nach zwölf Monaten war nach dem operativem Vorgehen nur marginal und inkonsistent besser als nach konservativer Versorgung. Wichtig, so betonte Gebhardt, seien allerdings ein optimal angepasster Gips, was zeitaufwändig sei, und regelmäßige Kontrollen, um ein Abrutschen (in der Studie bei einem Drittel der Patienten) gegebenenfalls rechtzeitig zu entdecken. In solchen Fällen ist innerhalb von acht Tagen immer noch eine sekundäre operative Versorgung mit vergleichbarem Ergebnis möglich. Die konservative Behandlung hat laut Gebhardt zudem den Vorteil, dass die Implantantentfernung wegen Problemen der Strecksehnen entfalle. **wk**

Hüftendoprothese: pro und kontra Zement

Die absolute Zahl der Hüftendoprothesen steigt kontinuierlich. 2015 wurden laut Statistischem Bundesamt 178.599 primäre Hüftendoprothesen implantiert und 19.902 Prothesenwechsel durchgeführt. Die Revisionsrate lag bei 1,7 beziehungsweise 8,0 %, das Verhältnis von Primär- zu Revisionseingriffen bei 9:1, wie PD Dr. Maik Hoberg, Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus, Universität Würzburg, die Situation skizzierte. Die Frage, ob Hüftendoprothesen besser zementiert werden sollten

oder nicht, lässt sich für Hoberg nicht so leicht beantworten: Es gebe kaum vergleichende Studien. Zudem sei das Prothesenüberleben multifaktoriell bedingt und auch von der Zementiertechnik abhängig. „Wird der Zement im Vakuum angemischt, erhöht dies die Dichte und führt zu einer reduzierten Revisionsrate“, erläuterte Hoberg.

Aus Studien und Registern verschiedener Länder lässt sich aber insgesamt schließen, dass für zementierte versus nicht zementierte Schäfte in den ersten

zehn Jahren kein Unterschied besteht. Im weiteren Verlauf sprechen die Daten dafür, dass nach Zementierung mehr Revisionen erforderlich sind.

Auch bei früh endoprothetisch versorgten Patienten, die in der Regel ein höheres Risiko für einen Prothesenwechsel haben, sei die Zementierung eher nachteilig. An der Pfanne scheint eine Zementierung dagegen Vorteile für das Überleben zu bringen. Insgesamt riet Hoberg dazu, junge Patienten zementfrei zu versorgen, während bei Älteren (≥ 75 Jahre) die Zementierung zu bevorzugen sei. **wk**