Adenokarzinom der Lunge

Histologie hat prädiktiven Wert

Die große Heterogenität von Lungenadenokarzinomen findet in der neuesten WHO-Klassifikation in Form einer Subtypisierung Berücksichtigung. Die aktuelle Klassifikation durch die International Association for the Study of Lung Cancer, die American Thoracic Society, die European Respiratory Society und die WHO basiert auf prädominanten histologischen Wachstumsmustern: lepidisch (LEP), papillär (PAP), azinös (ACN), mikropapillär (MIP) und solide (SOL).

Der prädiktive Wert dieser Subtypisierung mit Blick auf das Überleben bei einer adjuvanten Chemotherapie wurde nun untersucht. 582 Patienten der LACE-Bio-Kohorte konnten anhand der Tumorphistologie in das neue System klassifiziert werden: LEP (n = 24), ACN (n = 152), PAP

(n = 99), MIP (n = 40) und SOL (n = 267). Für die Analyse wurden drei Gruppen gebildet: LET, ACN/PAP und MIP/SOL.

Bezüglich des Gesamtüberlebens unterschieden sich die histologischen Subgruppen nicht. Jedoch waren in der univariaten Analyse das krankheitsfreie Überleben und das spezifische krankheitsfreie Überleben in der Subgruppe MIP/SOL schlechter als in den Subgruppen LEP und ACN/PAP ($p < 0,01$).

MIP/SOL-Patienten profitierten im krankheitsfreien Überleben (HR 0,60; $p < 0,01$) und im spezifischen krankheitsfreien Überleben (HR 0,59; $p = 0,01$) signifikant von der adjuvanten Chemotherapie im Vergleich zur Beobachtung, im Gesamtüberleben aber nur tendenziell (HR 0,71; $p = 0,18$). Patienten der ACN/

Das Adenokarzinom der Lunge kann nun anhand der histologischen Wachstumsmuster genauer charakterisiert werden.

PAP-Subgruppe hatten durch die adjuvante Chemotherapie keinerlei Vorteile im Gesamtüberleben oder im spezifischen krankheitsfreien Überleben.

Kathrin von Kieseritzky

Tsao MS et al. Subtype Classification of Lung Adenocarcinoma Predicts Benefit From Adjuvant Chemotherapy in Patients Undergoing Complete Resection. J Clin Oncol. 2015;33(30):3439-46.

Ovarialkarzinom

Bevacizumab vor allem bei hohem Risiko sinnvoll

Der Anti-VEGF-Antikörper Bevacizumab scheint insbesondere bei Ovarialtumoren mit hohem Progressrisiko, z. B. bei großen postoperativen Residualtumoren, im Vergleich zu einer alleinigen Chemotherapie die Gesamtüberlebenszeit zu erhöhen. Das zeigen die Langzeitdaten der ICON7-Studie.

Einbezogen in die Studie waren 1.528 Patientinnen im frühen Erkrankungsstadium bei schlechter Prognose (FIGO-Stadium I/IIa bei Grad-3- oder Klarzellen-Histologie) sowie im fortgeschrittenen Stadium (FIGO-Stadium IIb-IV) bei optimaler oder suboptimaler Debulking-Operation. Beim progressionsfreien 3-Jahres-Überleben, dem primären Endpunkt, schnitten die Patientinnen unter der Standardchemotherapie plus Bevacizumab mit 21,3 Monaten signifikant besser ab als die Frauen unter der Carboplatin/Placitaxel-Kombination allein (20,3 Monate; HR 0,81; $p = 0,004$). Besonders effektiv war der Antikörper bei Frauen mit einem hohen Progressionsrisiko.

Die Langzeitdaten der ICON7-Studie mit einer medianen Beobachtungszeit von 48,9 Monaten ergaben insgesamt kei-

nen statistisch signifikanten Unterschied mehr zwischen den beiden Behandlungsarmen. Lediglich die Subgruppe von Frauen im frühen Stadium und mit schlechter Prognose, beispielsweise bei über 1 cm großen Residualtumoren, schnitt auch beim Gesamtüberleben unter der zusätzlichen Gabe von Bevacizumab besser ab als unter der alleinigen Chemotherapie.

Weitere Studien sollten nun die Vorteile der Antiangiogenese speziell bei dieser Hochrisiko-Konstellation untersuchen.

Barbara Kreutzkamp

Oza AM et al. Standard chemotherapy with or without bevacizumab for women with newly diagnosed ovarian cancer (ICON7): overall survival results of a phase 3 randomised trial. Lancet Oncol. 2015;16(8):928-36.

kurz notiert

Studie zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Mammakarzinom gestartet

Im September 2015 startete die INSEMA (Intergroup Sentinel Mamma)-Studie zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Patientinnen mit invasivem Mammakarzinom im Stadium I oder II und brusterhaltender Therapie. In der prospektiven, randomisierten Studie wird die axilläre Sentinel-Lymphknotenbiopsie mit dem Verzicht auf eine Axilla-Operation verglichen. Derzeit wird die axilläre Operation bei Brustkrebs mehr als Stagingprozedur ohne Einfluss auf die Brustkrebsmortalität angesehen, da das Risiko für die Entwicklung von Metastasen hauptsächlich vom biologischen Verhalten des Primärtumors abhängt.

INSEMA soll nun zeigen, ob der Verzicht auf die Entfernung des Sentinel-Lymphknotens einen Einfluss auf das krankheitsfreie Überleben hat und ob damit die operativen Komplikationen verringert werden können. An ca. 130 deutschen und einigen österreichischen Studienzentren werden Patientinnen mit frühem Brustkrebs und geplanter brusterhaltender Operation eingeschlossen. Die INSEMA-Studie ist mit einem Gesamt-Förderrahmen von 4,588 Millionen Euro eines der größten von der Deutschen Krebshilfe finanzierten Studienprojekte. Die Studienleitung liegt bei der Universitätsmedizin Rostock.

red.