Generalisierte Angststörung

Bei GAD immer kombiniert behandeln?

■ In einer Pro-Con-Debatte wurden auf einem Satellitensymposium im Rahmen des DGPPN-Kongresses die Argumente für und wider einer Kombination aus Pharmako- und Psychotherapie bei Generalisierter Angststörung (GAD) präsentiert. Konsens war: Die Datenlage ist äußerst dünn, manches spricht für die Kombination, diese ist aber keineswegs immer verpflichtend.

Kaum Studien zur Kombination bei GAD

Professor Dr. Borwin Bandelow, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Göttingen, betonte, dass viele Patienten für eine Psychotherapie erst durch medikamentöse Therapie zugänglich werden. In der Praxis würde auch die überwiegende Zahl der Psychotherapiepatienten zusätzlich mit Medikamenten behandelt. Meta-Analysen hätten – zumindest bei der Panikstörung – einen deutlichen Vorteil der Kombination gezeigt. Zu sozialen Phobien gebe es weniger Studien, allerdings auch Hinweise zugunsten der Kombination. Bei der GAD lägen jedoch fast keine Studien vor. Es sei aber anzunehmen, dass Medikamente und Psychotherapie an unterschiedlichen Stellen im Gehirn ansetzen und so synergistische Effekte zu erwarten seien. Es liege nahe, dass Psychotherapie im präfrontalen Kortex wirke und somit kognitiv höher stehende Zentren beeinflusse, während Medikamente an vielen Stellen im Gehirn wirkten, also auch auf „pri-

mitive“ Angstzentren wie die Amygdala, sagte Bandelow.

Integratives therapeutisches Denken gefordert

Dr. Dr. scient. pth. Dipl.-Psych. Reinhard J. Boerner, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück, plädierte für eine differenzierte Betrachtung der Indikation zur Kombinationstherapie bei GAD. Eine A-priori-Kombinationstherapie sei weder durch die empirische Datenlage, noch durch eine allgemeine Indikation beziehungsweise auch nicht unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte gerechtfertigt. Zur GAD seien bisher nur zwei Studien durchgeführt worden, von denen eine Studie eine problematische Pharmakotherapie beinhaltet habe. Eine Kombinationstherapie sei somit nicht generell, sondern nur bei spezifischen Indikationen begründbar, so etwa bei Therapieresistenz, ausgeprägter Komorbidität sowie Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Relation. Boerner forderte ein integratives therapeutisches Denken auf dem Hintergrund eines systemischen Therapie- und Störungsmodells, welches Therapieinterventionen je nach klinischer Notwendigkeit erlaube und gegebenenfalls kombiniere.

Dr. Gunter Freese

Satellitensymposium „GAD näher beleuchtet: Gibt es eine reine GAD? Welche Therapie ist die beste?“, DGPPN-Kongress, Berlin, 23.11.2011
Veranstalter: Pfizer Pharma GmbH

Multiple Sklerose

Wann soll man die Therapie umstellen?

■ Nach Versagen einer Basistherapie wird die Behandlung der schubförmigen MS häufig auf eine Eskalationstherapie umgestellt, obwohl das Komplikationsrisiko erhöht ist. Meist bedarf es jedoch keiner Eskalationstherapie. Dieser Schluss ergibt sich aus der multinationalen COPTIMIZE-Studie, in der mit einem β -Interferon unzureichend behandelte Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Switch auf Glatirameracetat (GLAT) profitierten.

Umstellung auf Glatirameracetat

An der nicht-interventionellen Studie nahmen 690 Patienten teil, die drei bis sechs Monate vor Einschluss in die Studie von einer in der Regel β -Interferon-basierten Therapie auf GLAT umgestellt worden waren. Die Gründe für den Switch bestanden in Unwirksamkeit, intolerablen Nebenwirkungen oder dem Nachweis neutralisierender Antikörper. Die Dauer der GLAT-Behandlung bis zur Auswertung betrug median 382 Tage.

Signifikanter Rückgang der Schubrate

Die Ergebnisse einer Zwischenauswertung wurden auf demECTRIMS/ACTRIMS 2011 in Amsterdam mitgeteilt [1]. Danach führte der Switch auf GLAT zu einem signifikanten Rückgang der annualisierten Schubrate von 0,84 auf 0,34 (–59,5 %; $p < 0,0001$). Außerdem profitierten die Patienten von einer signifikanten Verbesserung von Mobilität, Kognition und Fatigue. 53,4 % der Patienten gaben eine subjektive Besserung des Wohlbefindens durch den Switch auf GLAT an ($p < 0,0001$), 41 % fühlten sich unverändert. Die meisten Patienten (69,6 %) berichteten, die Verträglichkeit der Therapie würde ihnen seit dem Switch weniger Probleme bereiten ($p < 0,0001$); lediglich 4,8 % berichteten von einer Zunahme der Nebenwirkungen.

red

1. Ziemssen T et al. 5thECTRIMS/ACTRIMS, Amsterdam, 19.–22.10.2011, P510

Nach Informationen von Teva