Akuter ischämischer Schlaganfall

Thrombolyse unter NOAK?

Fragestellung: Können Patienten, die wegen Vorhofflimmern NOAK einnehmen, eine Thrombolyse erhalten, wenn sie einen ischämischen Insult erleiden?

Hintergrund: Die Standardtherapie bei ischämischem Insult ist entweder die systemische Thrombolyse mit rt-PA oder die Kombination von Thrombolyse und Thrombektomie. Die orale Antikoagulation stellt eine Kontraindikation für eine systemische Lyse dar. In Tierexperimenten war das Risiko zerebraler Blutungen bei einer Lysetherapie unter neuen oralen Antikoagulanzen (NOAK) nicht erhöht, aber es zeigte sich ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko bei der Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten (VKA).

Patienten und Methodik: Die Beobachtungsstudie verglich Schlaganfallpatienten, die eine intravenöse oder rekanalisierende mechanische Therapie erhielten und mit NOAK vorbehandelt waren, mit Patienten, die VKA erhalten hatten oder nicht antikoaguliert waren. Endpunkte waren die Häufigkeit intrakranieller Blutungen und der funktionelle Outcome.

Ergebnisse: Die Studie umfasste 78 NOAK-, 441 VKA- und 8.938 Patienten ohne Antikoagulation. Die mediane Zeit zwischen der letzten NOAK-Einnahme und Beginn der Rekanalisierung betrug 13 Stunden. Die INR zu Behandlungsbeginn bei VKA-Patienten betrug 1,3. Eine intrakranielle Blutung wurde bei 18,4 % der NOAK-, 26,8 % der VKA-Patienten und bei 17,4 % der nicht antikoagulierten Patienten beobachtet. Die Sterblichkeit nach drei Monaten betrug 23 % unter NOAK, 27 % unter VKA und 14 % bei den nicht antikoagulierten Patienten. Die Unterschiede waren statistisch nicht signifikant.

Seiffge DJ, Van Hooff RJ, Nolte CH et al. Recanalization therapies in acute ischemic stroke patients: Impact of prior treatment with novel oral anticoagulants on bleeding complications and outcome - A pilot study. *Circulation* 2015; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015484

Schlussfolgerungen: Nach Ansicht der Autoren ist das Blutungsrisiko einer intravenösen oder mechanischen rekanalisierenden Therapie bei mit NOAK vorbehandelten Schlaganfallpatienten nicht erhöht.

– **Kommentar** von Hans-Christoph Diener, Essen

Unzulässige Schlussfolgerung

Für mich ist es unverständlich, wie diese Publikation in einer so hochrangigen Zeitschrift wie *Circulation* publiziert werden konnte. Aus einer Beobachtungsstudie mit nur 78 Patienten, die mit NOAK vorbehandelt waren, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es sicher sei, diese Population mit einer systemischen oder mechanischen rekanalisierenden Therapie zu behandeln, ist, meiner Meinung nach, unzulässig. Unter dieser Therapie sind generell intrakranielle Blutungen selten und es würde eine deutlich größere Population benötigt werden, um zu diesen Schlussfolgerungen zu kommen. Zudem hatten fast alle VKA-Patienten eine INR von unter 2, bei der die Lyse keine erhöhte Blutungsrate aufweist und die letzte NOAK-Einnahme lag großteils solange zurück, dass wohl keine wesentliche antikoagulatorische Aktivität mehr vorlag.

Für die klinische Praxis gilt meiner Meinung nach weiterhin, dass Patienten die Dabigatran einnehmen und eine verlängerte aPTT haben oder Patienten die Apixaban, Rivaroxaban oder Edoxaban einnehmen und eine erhöhte Xa-Aktivität haben, nicht systemisch lysiert werden sollten. Patienten mit distalen Karotis- und proximalen Mediaverschlüssen sollten aber thrombektomiert werden.

Hier steht eine Anzeige.

Springer