Depression und depressive Symptome bei Ärzten

Erhöht die Assistenzarztstätigkeit das Risiko?

Fragestellung: Wie ist die Prävalenz von Depressionen und depressiven Symptomen bei Assistenzärzten?

Hintergrund: Erhebungen weisen auf eine hohe Prävalenz von depressiven Symptomen bei Assistenzärzten hin. Diese hat Auswirkungen auf Gesundheit und Zufriedenheit der Ärzte und auf die Patientenversorgung.

Methodik: Systematische, hochqualitative Suche und Metaanalyse von Studien zur Prävalenz von Depressionen oder depressiven Symptomen bei Assistenzärzten. Eine standardisierte Methode zur Erfassung depressiver Symptome war Bedingung für die Aufnahme einer Studie in die Metaanalyse.

Ergebnisse: Es wurden 54 Studien (mit insgesamt 17.560 Assistenzärzten) identifiziert, von denen 35 in Nordamerika und fünf in Europa durchgeführt wurden.

Mata DA, Ramos MA, Bansal N et al. Prevalence of depression and depressive symptoms among resident physicians: A systematic review and metaanalysis. JAMA 2015; 314: 2373–83

Die Prävalenz von Depressionen oder depressiver Symptomatik schwankte von 20,9–43,2 %, mit einer gepoolten Gesamtprevalenz von 28,8 % (95 %-Konfidenzintervall [KI] 25,3–32,5;

hohe Heterogenität, I^2 96 %). In der einzigen deutschen Studie (2012) lag die Prävalenz mit 13,3 % relativ niedrig, ebenso wie in der einzigen Schweizer Studie (2001 bis 2007) mit 15,1 % und in der einzigen auf psychiatrische Assistenzärzte beschränkten Studie (Großbritannien, 1974) mit 21,7 % (keine Neurologiestudien).

Es wurden 16 unterschiedliche Skalen oder Methoden verwendet, um depressive Symptomatik zu erfassen. Nur in drei Studien wurde ein strukturiertes klinisches Interview (nach DSM-Kriterien) durchgeführt. Die meisten Untersuchungen verwendeten Selbstbeurteilungsinstrumente wie den BDI und erhoben lediglich „depressive Symptomatik“, die ab einem studienindividuell festgelegten Schwellenwert als bedeutsam gezählt wurde.

Im Laufe der Untersuchungsjahre nahm die Prävalenz signifikant zu, durchschnittlich um 0,5 % pro Jahr (95 %-KI 0,03–0,9). Keinen signifikanten Unterschied in der Prävalenz gab es bezüglich der Region, chirurgische versus nicht chirurgische Fächer, Anfang oder Ende der Ausbildung, Alter oder Geschlecht. In sechs von sieben Studien, in denen die Teilnehmer vor und nach Beginn der Assistenzarztstätigkeit untersucht wurden, stieg die Prävalenz signifikant an (median 15,8 %, Spanne 0,3–26,3 %).

Schlussfolgerungen: Trotz der großen Heterogenität zwischen den Studien und methodischer Unzulänglichkeiten ist depressive Symptomatik bei Assistenzärzten offensichtlich häufig.

– Kommentar von Tom Bschor, Berlin

Die zeitliche Korrelation ist nicht zwingend eine kausale Korrelation

Krankheitssymptome bei Ärzten, zumal psychische, sind nach wie vor verdrängt und schambesetzt. Daher ist die hochrangig publizierte Metaanalyse zu begrüßen, und es ist erfreulich, dass 54 Untersuchungen gefunden werden konnten. Die gepoolte Gesamtprevalenz ist mit 28,8 % hoch, wenngleich berücksichtigt werden muss, dass es sich hier nicht um klinische Depressionsdiagnosen, sondern überwiegend lediglich um ein studienindividuell festgelegtes Ausmaß an depressiver Symptomatik handelt, und die Zahlen überwiegend auf Selbstbeurteilungsinstrumenten basieren. Zutreffend weisen die Autoren allerdings darauf hin, dass gerade Ärzte in einer Fremdbeurteilung möglicherweise Symptomatik aus Scham verschweigen würden. Leider existieren nur sehr wenige Informationen zur spezifischen Situation in den deutschsprachigen Ländern und in den nervenheilkundlichen Fächern.

Da keine Vergleichsgruppen von Nichtassistentenärzten dargestellt werden, ist die berichtete Prävalenz schwierig zu beurteilen. Die hierfür geeigneten sieben Studien weisen aber darauf hin, dass der Beginn der Assistenzarztzeit zu einem Anstieg der Prävalenz führt. Leider kann kaum eine Aussage getroffen werden, welche spezifischen Bedingungen der Assistenzarztstätigkeit mit dem Entstehen depressiver Symptomatik verknüpft sind. Das wäre für weitere Forschung von großer Bedeutung. Untersuchenswert wäre zum Beispiel der Zusam-

menhang mit der Gesamtarbeitszeit, mit Schichtdienst, mit der Anzahl von Nacht- und Wochenenddiensten, der Steilheit der Hierarchien, dem Führungsstil der Vorgesetzten, dem interkollegialen Zusammenhalt oder dem Gehaltsniveau. Andererseits muss die Aufnahme der Arbeitstätigkeit als ein biographisches Lebensereignis betrachtet werden, das den Übergang von einem freieren Studentenleben in ein etablierteres Leben mit einer Zunahme an Verantwortung bedeutet. Interessant wäre auch, inwieweit zeitgleiche Lebensereignisse (Ortswechsel, Heirat, Geburt von Kindern) für die depressive Symptomatik verantwortlich sein könnten. Die zeitliche Korrelation des Prävalenzanstiegs mit dem Beginn der Assistenzarztstätigkeit bedeutet ja nicht zwingend eine kausale Korrelation.

Prof. Dr. med. Tom Bschor, Berlin

Abteilung für Psychiatrie,
Schlosspark-Klinik, Berlin
E-Mail: bschor@schlosspark-klinik.de