Hormone in der Therapie der Multiplen Sklerose

Immunmodulation plus Östrogene

Fragestellung: Verbessern Östrogene die Therapie mit Glatirameracetat bei Frauen mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS)?

Hintergrund: Die Bedeutung von Hormonen für die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen wird immer wieder diskutiert, zumal der Anteil von Frauen an allen Autoimmunerkrankungen zum Teil deutlich höher ist, als der Anteil der Männer. Eindeutige immunologische Mechanismen, die durch Hormone begünstigt werden und bei der Entwicklung der MS eine Rolle spielen, konnten allerdings bis heute nicht identifiziert werden. So spielen Hormone bisher in der Therapie von Autoimmunerkrankungen, insbesondere auch der MS, keine Rolle. In Tierexperimenten zeigte Estriol sowohl antiinflammatorische als auch neuroprotektive Eigenschaften. In einer ersten kleinen einarmigen Studie wurde eine Reduktion von gadoliniumaufnehmenden Herden berichtet.

Patienten und Methodik: Die randomisierte, doppelblinde Phase-II-Studie an 16 akademischen Zentren der USA schloss 164 MS-Patientinnen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren ein, die mit Glatirameracetat (20 mg/d s.c.) und mit oralem Estriol 8 mg täglich oder Placebo über einen Zeitraum von 24 Monaten behandelt wurden. Die Studie wurde zwischen 2007 und 2014 durchgeführt. Der primäre Endpunkt war die jährliche Schubrate nach zwei Jahren.

Ergebnisse: Die jährlich Schubrate betrug in der Glatirameracetat-plus-Estriol-Gruppe 0,25, in der Glatirameracetat-plus-Placebogruppe 0,37. Die Nebenwirkungsrate unterschied sich zwischen den Gruppen nicht. Allerdings traten in der Estriol-Gruppe vermehrt Unregelmäßigkeiten der Periode auf (23 % vs. 4 %), doch war die Zahl der vaginalen Infektionen in der Estriol-Gruppe signifikant niedriger als in der Placebogruppe (1 % vs. 11 %).

Voskuhl RR, Wang HJ, Wu TCJ et al. Estriol combined with glatiramer acetate for women with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial *Lancet Neurol.* 2016; 15: 35–46

Schlussfolgerungen: Die Autoren folgern, dass Estriol tatsächlich auch bei MS-Patientinnen einen antiinflammatorischen Effekt hat. Größere Studien sind notwendig, um diese präliminären Daten zu bestätigen.

– **Kommentar** von Volker Limmroth, Köln

Männer benachteiligt

Zweifelloos eine pathophysiologisch spannende Studie, die repliziert werden sollte. Dass Östrogene einen milden antiinflammatorischen Effekt haben, ist wahrscheinlich nicht verwunderlich. Ob sich daraus allerdings ein ernsthaftes Therapiekonzept entwickeln lässt, ist angesichts der inzwischen verfügbaren neuen Substanzen nicht sehr wahrscheinlich. Trotz der erstaunlich niedrigen Nebenwirkungsquote bleibt auch zu berücksichtigen, dass Östrogene viele Langzeiteffekte haben können, von Beeinflussung der Gerinnung bis zu Begünstigung spezifischer Malignome. In Einzelfällen mit besonderen klinischen Konstellationen ist eine ergänzende Therapie mit einem Östrogen bei Frauen sicher vorstellbar. Eine breit angewendete Dauerbehandlung erscheint – zumindest bei männlichen Patienten recht unwahrscheinlich.

Hier steht eine Anzeige.

Springer