Medikamentöse Therapie des Schädel-Hirn-Traumas

Erythropoietin ist nicht neuroprotektiv wirksam

Fragestellung: Ist Erythropoietin bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma neuroprotektiv wirksam?

Hintergrund: Bislang gibt es keine evidenzbasierte medikamentöse Therapie zur Neuroprotektion bei Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma. Alle prospektiven, randomisierten Studien der letzten Jahre verliefen negativ. Erythropoietin hat in Tiermodellen des Schädel-Hirn-Traumas eine neuroprotektive Wirksamkeit sowie pleiotrope Effekte gezeigt. Vor diesem Hintergrund schien es gerechtfertigt, eine Therapiestudie mit Erythropoietin bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma durchzuführen.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine prospektive, randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie, die in Australien, Neuseeland und einigen europäischen Ländern durchgeführt wurde. Die Studie schloss zwischen Mai 2010 und November 2014 insgesamt 606 Patienten ein, die innerhalb von 24 Stunden nach dem Traumaereignis randomisiert wurden.

Die Studienteilnehmer waren im Mittel 30 Jahre alt, 16 % waren Frauen. Bei dem Großteil der Patienten waren Verkehrsunfälle oder Stürze die Ursache des Schädel-Hirn-Traumas. Insgesamt 75 % der Patienten hatten ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Die Studienteilnehmer erhielten entweder einmal wöchentlich 40.000 Einheiten Erythropoietin subkutan über einen Zeitraum von drei Wochen oder Placebo.

Der primäre Outcome war der neurologische Befund, der mithilfe der Extended Glasgow Outcome Scale nach sechs Monaten erhoben wurde.

Für die Endauswertung standen die Daten von 302 Patienten in der Erythropoietin- und 294 in der Placebogruppe zur Verfügung. Verglichen mit Placebo zeigte Erythropoietin keine Wirkung bei Patienten mit schwerwiegenden Restschäden (jeweils 44 % der Patienten). Auch ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der Sterblichkeit. Bei der Häufigkeit tiefer Beinvenenthrombosen fand sich ebenfalls kein Unterschied zwischen der Erythropoietin- und der Placebogruppe.

Nichol A, French C, Little L et al.
Erythropoietin in traumatic brain injury (EPO-TBI): a doubleblind randomised controlled trial.
Lancet 2015; 386: 2499–506

Schlussfolgerungen: Die Gabe von Erythropoietin hat keinen Einfluss auf die Schwere der neurologischen Ausfälle nach einem Schädel-Hirn-Trauma.

– **Kommentar** von Hans-Christoph Diener, Essen

Kein Licht am Therapiehorizont

Die hier vorgestellte randomisierte Studie reiht sich in eine Reihe anderer Studien mit neuroprotektivem Ansatz beim schweren Schädel-Hirn-Trauma ein, die alle ein negatives Ergebnis hatten. In letzter Zeit betraf das Untersuchungen zum Einsatz von Kortikosteroiden und Progesteron. Bezüglich einer Behandlung mit Erythropoietin war bereits parallel zu der hier vorgestellten Studie eine kleinere Untersuchung mit 200 Patienten durchgeführt worden, die ebenfalls negativ verlaufen war. Vor dem Hintergrund der aktuellen Datenlage bleibt die medikamentöse Behandlung des schweren Schädel-Hirn-Traumas weiterhin unbefriedigend.

Hier steht eine Anzeige.

Springer