keit und Risiken dieser Maßnahme abwägen – auch im Vergleich mit anderen verfügbaren Möglichkeiten. Geprüft wird bei der frühen Nutzungsbewertung neu auf den Markt gebrachter Arzneimittel nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) also nicht nur die Wirksamkeit (das war bereits eine Aufgabe des Zulassungsverfahrens), sondern der Zusatznutzen im Vergleich zum Standard. Ziel ist laut G-BA-Vorsitzendem Prof. Dr. Rainer Hess aber nicht, Arzneimittel von der Kostenübernahme auszuschließen, sondern anhand der frühen Nutzenbewertung in die Preisverhandlung zu gehen. „Der vom Hersteller festgesetzte Preis gilt also nur noch ein Jahr und wird dann im System neu ausgehandelt.“ Für Ärzte bedeutet das laut Hess: „Sie kriegen in Zukunft viel mehr Hinweise auf die Qualität eines Arzneimittels als bisher.“ Denn der Bewertung liegen alle bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Daten zum neuen Verfahren/neuen Medikament zugrunde – auch nicht publizierte.

Perspektive der Patienten wichtig

Der Vergleich mit dem Standard ist allerdings schwierig, denn oft liegen keine direkten Vergleichsstudien vor. Prof. Dr. Jürgen Windeler, Leiter des IQWiG, sieht das im Hinblick auf die frühe Nutzenbewertung pragmatisch: „Wir können das von den Firmen fordern. Wenn sie das nicht liefern, ist das auch eine Aussage.“ Eins ist Windeler aber wichtig: Bei der Bewertung des medizinischen Nutzens ist ganz überwiegend die Perspektive des Betroffenen einzunehmen! Deshalb fordert er auch, dass Studien immer die Lebensqualität mit erfassen.

Priorisierung ist nicht Rationierung

Wenn in Deutschland das Wort „Priorisierung“ fällt, denken alle sofort an Rationierung, beklagte Prof. Dr. Dr. Hans Heinrich Raspe, Lübeck. Dabei meint dieses Wort eigentlich etwas anderes, nämlich die ausdrückliche Feststellung einer Vorrangigkeit bestimmter Untersuchungs- und Behandlungsmethoden vor anderen. Dabei ist eine Priorisierung nicht gleichbedeutend mit den

Empfehlungsgraden der Leitlinien, weil die Maßnahmen in ihrer Bedeutung auch gegeneinander abgewogen werden. Die Priorisierung führt dadurch zu einer Rangreihe mit dem nach Datenlage und fachlichem wie öffentlichem Konsens als unverzichtbar/am wichtigsten geltenden an oberster und dem Wirkungslosen, gar Schädenden an unterster Stelle. Priorisierung will vor allem informierte Entscheidungen ermöglichen. Sie bezieht sich nicht nur auf Methoden, sondern kann auch auf Krankheitsfälle, Krankheitsgruppen, Versor-

gungsziele und vor allem Indikationsbereiche angewendet werden (Beispiele siehe Kasten unten).

Auch ohne wirtschaftliche Not sinnvoll

Priorisierung ist auch nicht immer ein Unterfangen bei defizitärer Haushaltslage, betonte Raspe. Norwegen hat die Diskussion im Gegenteil zu dem Zeitpunkt begonnen, als das Nordseeöl dem Land immer größere finanzielle Möglichkeiten eröffnete. Eine schwedische Parlamentskommission veröffentlichte

Priorisierung – praktische Beispiele

Infektionserreger

Soeben veröffentlichte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Priorisierung der 127 in Deutschland vorkommenden Infektionserreger nach ihrer Bedeutung für die epidemiologische Forschung und Überwachung. Die Wichtigkeit wurde dabei anhand von zehn Bewertungskriterien entwickelt, darunter Sterblichkeit, Häufigkeit, Krankheitslast und Therapiemöglichkeit. Das soll auch die Basis sein, um Ressourcen gezielt zu nutzen, wie RKI-Präsident Reinhard Burger betonte. Es ist durchaus daran gedacht, dass in einzelnen Regionen oder von bestimmten Institutionen die Priorisierung nach den eigenen Bedürfnissen anhand der transparenten Kriterien modifiziert werden kann.

Die höchste Priorität erhielten Erreger wie HIV, Influenza, Legionellen, Masern oder Tuberkulose, aber auch Krankenhauskeime mit Resistenzproblemen wie *Klebsiella* oder *Staphylococcus aureus* und solche, die in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen werden, wie *Campylobacter*, *Helicobacter pylori* oder das Respiratorische Synzytial Virus (RSV).

■ Balabanova J et al. PLoS One 2011; 6: e25691.

Influenzavirus.

FK ■

© Spectral design/fotolia

Gesundheitsziele im Alter

Ältere Patienten mit chronischen Erkrankungen setzen möglicherweise andere Prioritäten als Behandler oder jüngere Patienten. Eine amerikanische Erhebung zur Priorisierung der Gesundheitsziele in Seniorenresidenzen und Einrichtungen mit betreutem Wohnen zeigte, dass der Erhalt der Selbstständigkeit von 76% als das wichtigste Gesundheitsziel angegeben wird, nicht das Überleben an sich. Diejenigen, die dem Leben die höchste Priorität einräumten, gaben als nächstwichtiges Ziel aber zu zwei Dritteln ebenfalls den Erhalt der Selbstständigkeit an, erst dann gefolgt von Schmerz- und Symptomlinderung. Die Priorisierung der Betroffenen selbst kann sowohl auf individueller als auch auf der Populationsebene von Bedeutung sein. So sollten beispielsweise Studien den Erhalt der selbstständigen Lebensweise als Endpunkt mit berücksichtigen. Die allgemeine Erfassung der Lebensqualität allein genügt als patientenbezogener Endpunkt nicht. Im Einzelfall könnte die individuelle Priorisierung als Ausgangspunkt für Gespräche über persönliche Ziele, Präferenzen und Wünsche genutzt werden.

FK ■

■ Fried TR et al. Arch Intern Med 2011; 171: 1854–1855

WEBTIPP: Projekte der DFG-Forscherguppe FOR655 zur Priorisierung:
www.priorisierung-in-der-medizin.de