Was ist neu in der medikamentösen Therapie?
Wir halten Sie auf dem Laufenden mit Berichten von Kongressen und Symposien der pharmazeutischen Industrie.

Diabetiker über 75 Jahre

Eine Reihe von Argumenten spricht für DPP-4-Hemmer

Bei Typ-2-Diabetes rückt zunehmend der ältere Patient jenseits des 75. Lebensjahr in den Fokus. Er ist aufgrund der demografischen und epidemiologischen Entwicklungen in der Praxis immer häufiger anzutreffen. Nach den Ausführungen von Prof. D. Müller-Wieland, Hamburg, müssen bei ihm eine Reihe von Besonderheiten berücksichtigt werden:

- a) Nachlassende Nierenfunktion: 50% der Patienten weisen eine deutliche Niereninsuffizienz auf.
- b) Gestörte Hypoglykämie-Wahrnehmung.
- c) Häufige Multimorbidität mit Polypharmazie und entsprechender Gefahr von Arzneimittelinteraktionen.

Einfache Handhabung bei Niereninsuffizienz

Nierenfunktionsstörungen können eine Kontraindikation für Metformin sein, die Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung spricht gegen Sulfonylharnstoffe. Eine gute Alternative für ältere Diabetiker sind laut Müller-Wieland DPP-4-Hemmer wie

Vildagliptin (Galvus®). Letzteres sei „hypoglykämiesicher“, wirke bei Patienten über 75 Jahren ebenso zuverlässig wie bei Jüngeren, und es ist in dieser Altersgruppe gut untersucht, so der Experte. Kürzlich wurde Vildagliptin sowohl in Monotherapie, z. B. bei Unverträglichkeit oder Kontraindikationen gegen Metformin, als auch für Patienten mit Nierenerkrankungen zugelassen.

Vildagliptin kann in sämtlichen Stadien der Niereninsuffizienz verordnet werden, so Müller-Wieland. Bei einer GFR über 50 ml/min beträgt die Dosis 2 x 50 mg/d. Bei niedrigerer GFR bis zum Stadium der Dialyse wird die Dosis auf 1 x 50 mg/d halbiert. Bei Dialysepatienten sollte der Einsatz des DPP-4-Hemmers jedoch mit Vorsicht erfolgen.

Ein weiteres Argument für den Einsatz bei alten Patienten berichtete Prof. Werner Kern, Ulm: Vildagliptin wird im Gegensatz zu anderen DPP-4-Hemmern nicht über CYP3A4 verstoffwechselt, was die Gefahr für Interaktionen minimiert. Auch hinsichtlich der kardiovaskulären Sicherheit sieht die Substanz laut Kern bisher gut aus: Bei einer prospektiven Überprüfung sämtlicher kardiovaskulärer Komplikationen bei ca. 13 500 Patienten in 25 klinischen Studien zeigte sich ein Trend zu einer Risikoreduktion (RR: -16% für 2 x 50 mg/d bzw. RR -12% für 1 x 50 mg/d) gegenüber den jeweiligen Vergleichssubstanzen.

■ Dr. med. Dirk Einecke
Quelle: Symposium „Diabetes und Co-Morbiditäten: Behandlung des Typ-2-Diabetes aus diabetologischer, hypertensiologischer und ophthalmologischer Sicht“, DGIM-Jahreskongress, Wiesbaden, April 2012 (unterstützt von Novartis)

Diabetestherapie im Alter: hier müssen Besonderheiten berücksichtigt werden.

Kurz notiert

Ist gegen Allergien ein Kraut gewachsen? ▶ In Österreich ist seit vier Jahren ein Antiallergikum mit den Inhaltsstoffen der Wurzel des mongolischen Tragant (Astragalus membranaceus) unter dem Namen Lectranal® bekannt. In Deutschland ist dieses Präparat seit Januar 2012 unter dem Namen Allvent® als ergänzende bilanzierte Diät in den Apotheken erhältlich. Laut Dr. Hartmut Dorstewitz, Kirchseeon, ist dies bisher das einzige Phytotherapeutikum, das die Sensibilität gegenüber Pollen senkt und allergische Reaktionen auf natürliche Weise durch die Verschiebung der spezifischen Immunantwort über TH1 zu Gunsten von IgG unterbindet. Eine klinische Studie mit 48 Gräser- und Ambrosiapollenallergikern kam zu dem Ergebnis, dass der Astragalus-Extrakt die Allergiesymptome in Vergleich zu Placebo deutlich reduzierte (Matkovic et al. Phytother Res 2012; 24: 175–81). Weber & Weber

Osteoporose bei Männern ▶ Bald können auch Männer von der Effektivität und dem lang anhaltenden Frakturschutz von Strontiumranelat (Protelos®) profitieren. Am 24. Mai 2012 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA eine weitreichende Zulassungserweiterung empfohlen: Zusätzlich zur Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen kann das Präparat künftig auch bei Männern mit erhöhtem Frakturrisiko eingesetzt werden.

Servier