Was ist neu in der medikamentösen Therapie?
Wir halten Sie auf dem Laufenden mit Berichten von Kongressen und Symposien der pharmazeutischen Industrie.

© Archiv

Neuer Ansatz bei Alkoholabhängigkeit

Trinkmengenreduktion als Ergänzung zur Abstinenz

— Reduziertes Trinken ist ein sinnvolles Ziel für alkoholabhängige Patienten. Eine Reduktion des Alkoholkonsums wurde in klinischen Studien durch eine bedarfsabhängige Einnahme des Opioidrezeptormodulators Nalmefene erreicht.

In Deutschland sind schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen alkoholabhängig. Bei insgesamt 10,1 Millionen Menschen gehe man von einem riskanten Konsum aus, berichtete Prof. Thomas Hillemacher, Hannover. Die sozialen, medizinischen und ökonomischen Konsequenzen sind gravierend. Wie auch bei anderen Suchterkrankungen bildet sich ein Suchtgedächtnis aus, das auch nach einem Entzug und längerer Abstinenz Craving und Rückfälle auslösen kann.

Reduziertes Trinken – medikamentös unterstützt

Alkoholabstinenz ist zwar eine relevante Ziel- und Lebensoption; sie sollte aber um

Abb. 1 ESENSE-1-Studie: Reduktion des Gesamt-Alkoholkonsums (TAC) unter einer Behandlung mit Nalmefene.

zieloffene Reduktionsprogramme ergänzt werden, postuliert Prof. Joachim Körkel, Nürnberg. Im Rahmen von Reduktionsprogrammen basiert die Behandlung auf einer von Arzt und Patienten gemeinsam getra-

genen Zielvereinbarung. Ziel ist die Einhaltung der individuell festgelegten Konsumobergrenze. Eine Trinkmengenreduktion kann laut Körkel eine Brücke zur Abstinenz sein; sie kann aber auch eine sinnvolle Option für Patienten sein, die mit Abstinenz schon mehrfach gescheitert sind. Dadurch könnten mehr Menschen zu einer Veränderung ihres Alkoholkonsums motiviert werden.

Der Opioidrezeptormodulator Nalmefene kann Patienten bei der Reduktion der Trinkmenge unterstützen, so Prof. Karl Mann, Mannheim. Die Substanz führte in drei klinischen Studien mit insgesamt knapp 2000 Patienten zu ei-

Kurz notiert

Asthma bronchiale ► Eine neue inhalative Fixkombination zur Behandlung von Asthma bronchiale ist vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für den deutschen Markt zugelassen worden. Das Unternehmen Mundipharma plant, flutiform® im September in Deutschland auf den Markt zu bringen. Das Medikament enthält das inhalative Glukokortikoid Fluticasonpropionat und den lang wirksamen Beta-2-Agonisten Formoterolfumarat in einem

treibgasgetriebenen Dosieraerosol mit Dosiszähler. In Phase-III-Studien hat das Medikament seine Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit gezeigt.

Mundipharma

Vancomycin-Zulassung erweitert

► Ab sofort steht Vancomycin (als Enterocaps® 250 mg) auch zur Therapie von Patienten mit leichter und mittlerer Clostridium-difficile-assoziiierter Diarrhö (CDAD) zur Verfügung, teilte das Unternehmen Riemser Arznei-

mittel mit. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe einer Erweiterung der bisher zugelassenen Indikation von der schweren, pseudomembranösen Kolitis auf alle CDAD-Fälle zugestimmt. Aufgrund der Zulassungserweiterung könne das Präparat jetzt für die Behandlung aller CDAD-Patienten eingesetzt werden und ermögliche so jedem Patienten eine bedarfsgerechte Therapie – noch bevor sich eine schwere Erkrankung entwickelt. Riemser Arzneimittel