ner Abnahme des Alkoholkonsums. In der ESENSE-1-Studie (n = 604) kam es bei bedarfsabhängiger Einnahme von 20 mg Nalmefene bereits nach einem Monat zu einer gegenüber Placebo signifikanten Reduktion der Tage mit starkem Trinkverhalten und der gesamten Alkoholmenge (Abb. 1). Die Effekte auf das Trinkverhalten waren mit einer schnellen Verbesserung des klinischen Gesamteindrucks (Clinical Global Impression, CGI) assoziiert, die bereits nach einer Woche statistisch signifikant war.

■ Abdol A. Ameri

Quelle: Interaktive Veranstaltung „Alkoholabhängigkeit – eine Erkrankung mit vielen Gesichtern“, Berlin, Juni 2012 (Veranstalter: Lundbeck)

Kurz notiert

Insulintherapie bei Senioren mit funktionellen Einschränkungen

Der 82-jährige Hermann A. wird aufgrund einer Urosepsis mit Exsikkose in eine Klinik eingeliefert. Seine bisherige Insulintherapie zeigt erhöhte HbA_{1c}-Werte.

Frau Dr. Bahrman erläutert in der Online-Fortbildung, weshalb der Patient zu den Slow-Gos zählt und welchen Einfluss dies auf seine Therapie hat. Die Ärztin berücksichtigt dabei die geriatrischen Leitlinien und stellt die Insulintherapie von Hermann A. adäquat um. In den Fokus rücken dadurch einfache Therapieoptionen und die postprandiale Gabe kurz wirksamer Insulinanaloga wie Humalog®.

Nehmen Sie teil und erfahren mehr zur Insulintherapie bei Slow-Gos: www.lillyfortbildung.de

Antihypertensive Dreifachkombinationen im Vergleich „Sieg mit kurzem Kopf“ für Valsartan

Bei mittelschwerer Hypertonie gelingt mit einer fixen Dreifachkombination binnen kurzer Zeit eine exzellente Blutdruckkontrolle. In einer direkten Vergleichsstudie war dabei Valsartan etwas stärker wirksam als Olmesartan.

— Im Pferderennsport spricht man vom „Sieg mit einem kurzen Kopf“, wenn der Ausgang des Kopf-an-Kopf-Rennens zwar eindeutig war, aber eher knapp. Hatte ein Pferd nur „die Nase“ vorn, muss meist ein Zielfoto entscheiden.

Letzteres war beim ersten Direktvergleich zweier antihypertensiver Dreifachkombinationen nicht notwendig: Valsartan/Amlodipin/HCTZ war statistisch signifikant stärker wirksam als Olmesartan/Amlodipin/HCTZ, wobei der Unterschied im Bereich von 2–3 mmHg lag.

Erst die Dreifachkombi kontrolliert den Blutdruck

Die beiden in Deutschland als Fixkombination erhältlichen Dreifachkombinationen waren in einer kürzlich publizierten prospektiven randomisierten Studie bei 180 Patienten mit Hypertonie der Stufe 2 (Ausgangsblooddruck bei Praxismessung 170/104 mmHg) verglichen worden. Behandelt wurde zunächst vier Wochen lang mit Amlodipin/HCTZ (5/12,5 mg/d). Bei 149 Patienten sank der Blutdruck nicht in den Normbereich. Sie erhielten über weitere vier Wochen zusätzlich Valsartan 160 mg/d oder Olmesartan 20 mg/d.

Beide Dreifachkombinationen (ExforgeHCT, Vocado HCT, Sevika HCT) führten zu einer signifikanten zusätzlichen Blutdrucksenkung im Vergleich zu den Zweifachkombinationen, ohne zusätzliche Nebenwirkungen. In den geprüften mittleren Dosierungen erwies sich Valsartan als etwas wirksamer als Olmesartan: Der durchschnittliche 24-Std.-Blutdruck fiel von ausgangs 153,1/91,5

mmHg auf 121,6/66,1 mmHg nach acht Wochen. Die Olmesartan-Kombination senkte den Druck von 153,7/91,8 mmHg auf 124,8/68,8 mmHg. Damit war die Blutdrucksenkung unter Valsartan um 2,66/2,45 mmHg stärker. Die Differenz war nachts mit 3,14/3,81 mmHg etwas ausgeprägter.

Kleine Unterschiede klinisch relevant?

Die Autoren halten es für möglich, dass dieser Unterschied klinisch relevant sein könnte, da auch kleine Blutdruckdifferenzen langfristig das kardiovaskuläre Risiko substantiell reduzieren. Als Ursache diskutieren sie potenzielle unterschiedliche pharmakokinetische Interaktionen: Aus anderen Studien gebe es Hinweise, dass bei HCTZ/Valsartan-Kombinationen die Serumkonzentration des Diuretikums höher ist als bei HCTZ/Olmesartan-Kombinationen.

Leitlinien empfehlen, frühzeitig zu kombinieren

Hochdruckleitlinien empfehlen heute den frühzeitigen Einsatz von Kombinationstherapien. Übersteigt der Blutdruck 160/100 mmHg, lautet die Empfehlung, initial zwei Blutdrucksenker zu kombinieren und die Behandlung zügig zu eskalieren, bis der Druck kontrolliert ist (< 140/90 mmHg). Fixkombinationen erleichtern dabei die Behandlung und erhöhen die Compliance.

Kombiniert man Antihypertensiva mit komplementären Wirkmechanismen, potenzieren sich die Wirkungen, während die Nebenwirkungen gering bleiben. Die neuesten Leitlinien der European Society of Hypertension raten explizit zu Zweier- und Dreierkombinationen von Blockern des Renin-Angiotensin-Systems, Diuretika und Kalziumantagonisten.

■ Red.

Quelle: Fogari R, Zoppi A, et al. Effects of valsartan versus olmesartan addition to amlodipine/hydrochlorothiazide combination in treating stage 2 hypertensive patients. Expert Opin. Pharmacother. 2012; 13(5): 629–636