Ranibizumab bei feuchter AMD

Viele Patienten profitieren langfristig

— 4-Jahres-Daten aus der Praxis zeigen: Bei rund zwei Drittel der Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration (AMD) kann Ranibizumab den Visus anhaltend verbessern oder stabilisieren.

Nach der Diagnose „feuchte AMD“ haben Patienten über die ersten vier Jahre gute Chancen, dass Ranibizumab (Lucentis®) ihr Sehvermögen deutlich verbessert oder stabilisiert. Dies belegen Daten, die Prof. Heinrich Gerding, Olten/Schweiz, an eigenen Patienten erhoben hat. Nach einem Jahr zählte fast die Hälfte der 104 Patienten zur Gruppe der „Gewinner“, definiert als Visusanstieg um mehr als fünf Buchstaben auf der Lesetafel (Graefes Arch Clin

Exp Ophthalmol 2011; 249: 653–662). Durchschnittlich hatten die Patienten nach einem Jahr 15,6 Buchstaben hinzugewonnen. Etwa 30% der Patienten waren „Stabilisierer“ (± 5 Buchstaben vs. Baseline) und 20% „Verlierer“ (> 5 Buchstaben Verlust).

Nach vier Jahren erwiesen sich – mit durchschnittlich + 17,5 Buchstaben im Vergleich zum Behandlungsbeginn – 38% der verbliebenen 84 Patienten als „Gewinner“, 30% als „Stabilisierer“ und 32% als „Verlierer“. Patienten des gesamten Kollektivs hatten im ersten Jahr durchschnittlich 5,8 Injektionen erhalten. In den Folgejahren nahm die Häufigkeit kontinuierlich ab. „Stabilisierer“ und „Verlierer“ hätten zu Be-

ginn aber vermutlich mehr Injektionen benötigt.

Gerdings Erachtens nach sollte im ersten und möglichst auch noch im zweiten Jahr monatlich die zentrale Netzhautdicke mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) kontrolliert werden, um den richtigen Zeitpunkt zur Reinjektion nicht zu verpassen. Die Daten zeigen: Je stärker sich der Visus kurzfristig verschlechterte, desto mehr ging dauerhaft verloren.

■ Dr. Matthias Herrmann
Quelle: Pressegespräch „Aktuelle Studien zeigen: Langfristige Visusverbesserung mit Lucentis® – Interimsdaten der RESTORE-Studie und 4-Jahres-Daten aus der Schweiz“, Nürnberg, Juni 2012 (Veranstalter: Novartis Pharma)

Kurz notiert

Schmerzmedizin ► Die Ausgabe 3/2012 der Zeitschrift Schmerzmedizin ist erschienen. Themen sind u. a.: Stoßwellentherapie der Triggerpunkte der Kaumuskulatur, das Patientenrechtegesetz und eine Petition zum Ausschluss stark wirksamer Opioidanalgetika von der allgemeinen Substitutionspflicht. Bezogen werden kann die Zeitschrift über die Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie e.V., Frau Nitsche, Adenauer Allee 18, 61440 Oberursel.

Neue Website zu Sitagliptin ► Ärzte können sich nun auch im Internet über die oralen Antidiabetika Xelevia®/Velmetia® informieren. Unter www.xelevia.berlin-chemie.de finden sich Daten und Fakten zur Therapie mit dem DPP-4-Hemmer, z. B. „Studien-daten kompakt“. Die Seite bietet auch eine App zum Thema „Orale Therapie des Typ-2-Diabetes“. Kostenlose Patienten-Broschüren runden das Serviceangebot ab. Berlin-Chemie

Hochdrucktherapie

Stark wirksamer Sartan-Nachwuchs

— Zur Hypertoniebehandlung steht mit Azilsartan (Edarbi®) seit Januar 2012 ein neuer AT₁-Blocker zur Verfügung, der sich durch starke und lang anhaltende Wirksamkeit auszeichnet.

Azilsartan weist eine besonders hohe Affinität zum AT₁-Rezeptor auf, berichtete Prof. Peter Baumgart, Münster. In der 80-mg-Dosierung wird der systolische Blutdruck stärker gesenkt als unter 320 mg Valsartan oder 40 mg Olmesartan (White WB et al. Hypertension 2011; 57: 413–420). Auch über 24 Stunden ist das neue Sartan mit einer Drucksenkung um 14,5 mmHg vs. 10,2 bzw. 12,0 mmHg wirksamer als die Vergleichssubstanzen. Nicht zuletzt war Azilsartan auch Ramipril (10 mg) überlegen (Böner G et al. J Clin Hypertens 2010; 28: e283).

In Frage kommt die neue Substanz damit v. a. für Patienten mit niedrigen Blutdruck-Zielwerten, etwa Diabetiker und Patienten mit Niereninsuffizienz und Proteinurie. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die systolische Hypertonie. Gerade bei älteren und alten Patienten dominiert oft die isolierte systolische Hypertonie, so Dr. Thomas Nikolaus, Bisingen. Ursache ist

Neues Sartan insbesondere bei niedrigen Blutdruck-Zielwerten verschreiben.

eine verminderte Gefäßelastizität, als deren Maß die Pulswellengeschwindigkeit herangezogen werden kann. Letzte korreliert auch mit der kardiovaskulären Mortalität (Mitchell GF et al. Circulation 2010; 121: 505–511).

In seiner Praxis konnte Nikolaus mit einem nicht invasiven Messverfahren eine Reduktion der Pulswellengeschwindigkeit und des zentralen systolischen Blutdrucks nach Umstellung auf Azilsartan nachweisen.

■ Dr. Andreas Fischer
Quelle: Pressekonferenz „Monotherapie der essenziellen Hypertonie – Azilsartan: mehr Wirkung in Klinik und Praxis“, München, Mai 2012 (Veranstalter: Takeda Pharma)