Was ist neu in der medikamentösen Therapie?
Wir halten Sie auf dem Laufenden mit Berichten von Kongressen und Symposien der pharmazeutischen Industrie.

Akute Nackenschmerzen

Schnelle Schmerzlinderung durch topisches Diclofenac

Über die Hälfte aller Berufstätigen leidet mindestens einmal pro Woche unter Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen, berichtete Heiko Dahl, Physio-Akademie Wremen. Die Wirksamkeit der meisten pharmakologischen und physiotherapeutischen Therapiemaßnahmen sei unzureichend durch klinische Studien belegt. Erste Schritte bei akuten Nackenschmerzen seien die Korrektur von Fehlhaltungen am Arbeitsplatz und Entlastungsübungen zu Hause. Darüber hinaus können systemische oder topische nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) akute muskulo-skeletale Schmerzen lindern.

Eine aktuelle randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie zeigt erstmals, dass topisches Diclofenac zu einer schnellen und effektiven Linderung akuter Nackenschmerzen führen kann, berichtete Prof. Hans-Georg Predel, Köln. Über einen Zeitraum von 96 Stunden applizierten 72

Studienteilnehmer mit akuten Nackenschmerzen viermal täglich entweder 2 g Diclofenac-Diethylamin-Gel (1,16%; Voltaren Schmerzgel®) oder Placebo. Bereits nach einer Stunde zeigte sich in der Diclofenac-Gruppe ein gegenüber Placebo signifikanter Rückgang der Schmerzen unter Bewegung ($p < 0,0001$) (Abb. 1). Ca. 95% der Patienten in der Diclofenac-Gruppe gaben nach zwei Tagen eine Schmerzreduktion um 50% an. Auch der Ruheschmerz war zu allen Untersuchungszeitpunkten signifikant geringer als in der Placebogruppe ($p < 0,0001$). In Bezug auf die funktionelle Einschränkung des Nackens zeigte sich in der Diclofenac-Gruppe die gleiche Besserung wie in der Placebogruppe nach vier Tagen.

Unter der Therapie traten laut Predel keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen auf. Die entzündliche Schmerztherapie mit topischem Diclofenac bei Nackenschmerzen ermög-

licht dem Patienten die schnelle Wiederaufnahme seiner Alltagsaktivitäten und die Durchführung entsprechender physiotherapeutischer Maßnahmen.

■ Abdol A. Ameri
Quelle: Pressegespräch „Nackenschmerzen – Aktuelle Studie bestätigt Wirksamkeit von topischem Diclofenac unter Anwendungsbedingungen“, Frankfurt, Juli 2012 (Veranstalter: Novartis Consumer Health)

Abbildung 1

Abb. 1 Wirksamkeit der Schmerzbehandlung mit topischem Diclofenac-Diethylamin-Gel (1,16%).

Kurz notiert

Fortbildung zur Clostridium-difficile-assoziierten Diarrhö ► Die Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD) ist die häufigste nosokomiale Durchfallerkrankung – mit steigender Tendenz. Dies betrifft auch den ambulanten Bereich. Um den erhöhten Informationsbedarf im hausärztlichen Bereich zu decken, stellt das Unternehmen Riemser Arzneimittel Fortbildungen bereit, u.a. ein zweiteiliges Online-Modul, in denen der Arzt durch mehrere Themenbereiche geführt wird (www.fortbildung-riemser.de). Auch bei der PriMed-Fortbildungsreihe wird über CDAD informiert (z. B. am 5.12.2012 in Nürnberg, Anmeldung unter Fax-Nr. 038351 76-48). Riemser

Versorgungssituation geriatrischer Typ-2-Diabetiker ► In der deutschlandweit angelegten VEGAS-Studie wurde erstmals die Versorgungssituation geriatrischer Typ-2-Diabetiker untersucht, die vor einer Insulinisierung stehen. Dabei standen praxisrelevante Einflussfaktoren (z. B. Hörprobleme, kognitive Defizite, Depression) und ärztliche Entscheidungsgründe im Mittelpunkt. „Bei der Ersteinstellung von geriatrischen Typ-2-Diabetikern auf Insulin prägt vor allem die praktische Umsetzbarkeit einer Therapie im Alltag die Wahl des Therapieziels und -regimes“, resümierte Dr. Dr. Andrej Zeyfang, Stuttgart. VEGAS zeigte auch, dass zielgruppenspezifische Schulungsprogramme wie die „Strukturierte Geriatrische Schulung“ (SGS) noch selten genutzt werden.

Berlin-Chemie