Behandlung von Psychosen bei Alzheimer-Patienten

Patienten mit Alzheimer-Erkrankung, die wegen Psychosen, Agitiertheit oder Aggressionen mit Risperidon erfolgreich behandelt wurden, erleben nach dem Absetzen des Neuroleptikums häufiger Rezidive als unter fortgesetzter Therapie.

— In einer zunächst offenen Studie wurden 180 Patienten mit M. Alzheimer (im Mittel 80 Jahre alt) wegen Psychosen, Agitiertheit oder Aggressionen vier Monate lang mit Risperidon (im Mittel 0,97 mg/d) behandelt. Anschließend traten 110 von 112 Patienten, bei denen die Behandlung erfolgreich war, in einen randomisierten, doppel-blinden Absetzversuch ein: eine Gruppe erhielt sofort für 32 Wochen statt Risperidon nur Placebo, eine zweite für 32 Wochen weiterhin Risperidon und eine dritte zunächst noch 16 Wochen Risperidon und anschließend Placebo.

Innerhalb der ersten 16 Wochen erlitten 60% der Patienten unter Placebo, aber nur 33% der weiterhin mit Risperidon behandelten Patienten ein Rezidiv. In den folgenden 16 Wochen kam es ebenfalls signifikant häufiger zu Rezidiven bei Patienten, bei denen Risperidon durch Placebo ersetzt wurde (48%) als bei denen, die weiterhin mit Risperi-

don behandelt wurden (15%). Bei Nebenwirkungen und Todesfällen gab es zwischen Patienten mit Verum und Placebo – bei allerdings kleiner Probandenzahl – keine Unterschiede.

■ D. P. Devanand et al.
Relapse risk after discontinuation of risperidone in Alzheimer's disease. New Engl. J. Med. 367 (2012) 1497–1507

Kommentar

Psychosen mit Agitiertheit und Aggression sind bei degenerativen Erkrankungen wie M. Alzheimer häufig. Sie belasten Patienten und Betreuer gleichermaßen und erfordern oftmals stationäre Behandlung. Obwohl die Wirksamkeit psychotroper Medikamente gegenüber Placebo nachgewiesen ist, bleibt ihr Einsatz wegen Nebenwirkungen durchaus umstritten und wird in der Regel zeitlich begrenzt. Die vorliegende Untersuchung hat aus diesem Dilemma einen interessanten Studienansatz abgeleitet: Was passiert, wenn eine erfolgreiche Behandlung mit Risperidon beendet wird? Es zeigt sich eindeutig, dass dann innerhalb weniger Wochen Rezidive von Psychosen, Agitiertheit und Aggressionen zwei- bis dreimal häufiger auftreten als bei den weiterhin aktiv behandelten Patienten.

H. HOLZGREVE ■

Bei Alzheimer-Patienten Neuroleptika besser nicht absetzen?