Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Optimierte Symptomkontrolle durch dualen Bronchodilatator

— Eine optimale Symptomkontrolle und die Verhinderung der Krankheitsprogression

Brennpunkt Lunge.

© Springer Verlag GmbH

sion gehören zu den Hauptzielen des COPD-Managements, betonte Prof. Tobias Welte, Hannover. Um diese zu erreichen, empfiehlt die Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) im Rahmen einer medikamentösen COPD-Therapie die kontinuierliche Behandlung mit langwirksamen Bronchodilatoren. In einschlägigen Studien erwies sich die Fixkombination aus dem langwirksamen β -Agonisten (LABA) Indacaterol und dem langwirksamen Muskarin-Antagonisten (LAMA) Glycopyrronium gegenüber den Monotherapien mit kurzwirksamen Anticholinergika, β_2 -Mimetika oder inhalativen Kortikosteroiden als überlegen. Diese Wirkstoffkombination steht unter der Bezeichnung Ultibro® Breezhaler® (QVA149) zur Verfügung.

Im Rahmen der QUANTIFY-Studie wurde der Effekt der Fixkombination Indacaterol/Glycopyrronium mit dem der Einzelsubstanzen Tiotropium und Formoterol verglichen. Hierbei erwies sich der duale Bronchodilatator gegenüber den Einzelsubstanzen als nicht-unterlegen, so das Studienergebnis. Zudem verbesserte sich das Symptom „Atemnot“ signifikant unter der Fixkombination gegenüber der Vergleichsmedikation. Dieser Effekt erklärt sich aus der synergistischen Wirkung des β_2 -Agonisten und Muskarin-Antagonisten am Zielort, kommentierte Welte.

Wolfgang Zimmermann

▪ Pressegespräch „Ultibro® Breezhaler® – Duale Bronchodilatation als Standard in der COPD-Behandlung“; Nürnberg, August 2015 (Veranstalter: Novartis)

Kurz notiert

Zulassungserweiterung für Insulin detemir → Die Europäische Kommission hat die Zulassung des Basalinsulins Insulin detemir (Levemir®) erweitert: Insulin detemir kann jetzt auch zur Behandlung des Diabetes mellitus bei Kindern ab dem Alter von einem Jahr eingesetzt werden. Die Zulassungserweiterung basiert auf den Daten der Studie BEGIN® YOUNG 1 zur Wirksamkeit und Sicherheit von Insulin detemir und Insulin degludec. In der randomisierten klinischen Studie bei Kindern und Jugendlichen (1–17 Jahre) mit Typ-1-Diabetes war die einmal oder zweimal tägliche Gabe von Insulin detemir in Kombination mit Insulin aspart auch für Kinder ab dem Alter von einem Jahr effektiv und gut verträglich: Die Rate bestätigter bzw. schwerer Hypoglykämien lag insgesamt bei 54,1 bzw. 0,33 Ereignissen pro Patientenjahr. „Die Zulassungserweiterung von Insulin detemir gibt Behandlern zusätzliche Sicherheit, dieses bewährte Medikament mit seinem positiven Wirksamkeits- und Verträglichkeitsprofil auch bei sehr jungen Patienten einzusetzen“, kommentierte Prof. Thomas Danne, Hannover, den Schritt der Europäischen Kommission.

Red.

▪ Nach Informationen von Novo Nordisk

Expertenvotum

Vorhofflimmern-Screening ist wichtig

— Vorhofflimmern (VHF) hat derzeit eine Prävalenz von 1–2% (bei über 85-Jährigen ca. 18%). VHF-Patienten weisen ein fünffach erhöhtes Schlaganfall-Risiko auf, und VHF-verursachte Schlaganfälle sind oft schwerwiegender als solche anderer Genese.

Daher hat das Unternehmen Daiichi Sankyo das britische Forschungsinstitut RAND Europe in Cambridge beauftragt, das VHF-Management in sechs EU-Ländern zu analysieren und künftige Entwicklungen aufzuzeigen. Aus Deutschland waren die Professoren A. Götte, Paderborn, R. Kreutz, Berlin, und H.-C. Diener, Essen, beteiligt.

Vorhofflimmern kann asymptomatisch sein und wird unterdiagnostiziert, so der Report. Eine Pulskontrolle bei jedem Arztbesuch, ggf. gefolgt von einem EKG, würde Abhilfe schaffen und wird von der European Society of Cardiology (ESC) als Screening-Maßnahme empfohlen.

Neben der Wiederherstellung des Sinusrhythmus steht die Schlaganfallprophylaxe im Vordergrund. Einsetzbar sind Vitamin-K-Antagonisten sowie neue orale Antikoagulanzen. Letztere gehen mit einem deutlich geringeren Blutungsrisiko einher, legte Götte anhand der ENGAGE-AF-TIMI-48-Studie mit dem Wirkstoff Edoxaban dar.

Vor Therapiebeginn sollte unbedingt der CHA₂DS₂-VASc-Score bestimmt werden, so Götte. Ein Score von 0 bedeutet: keine Therapieindikation. Die Antikoagulation bei einem Score von 1 wird diskutiert, die ESC empfiehlt sie bereits. Bei einem Score von 2, 4 und 6 beträgt das jährliche Insultrisiko 2,3%, 4% bzw. 9,8%. Spätestens hier sollte jeder Patient antikoaguliert werden.

Dr. Dirk Einecke

▪ Media & Expert Press Conference im Rahmen des Kongress der European Heart Rhythm Association (EHRA); Mailand, Juni 2015 (Veranstalter: Daiichi Sankyo)