Arbeit an der Stressachse bringt Erleichterung

So helfen Sie Hochsensiblen

Zu laut, zu stark, zu voll – Hochsensible nehmen Sinnesreize und Emotionen intensiver wahr als Andere. Wer sind diese Menschen und wie kann man ihnen helfen?

Prof. Dr. med. Peter Falkai
Direktor der
Psychiatrischen Klinik der
LMU, München

MMW: *Hochsensibilität ist nicht als Krankheit definiert, warum befasst sich dennoch die Wissenschaft damit?*

Falkai: Offensichtlich gibt es Menschen, die nicht im Sinne einer diagnostizierbaren Erkrankung krank sind, trotzdem aber leiden, beispielsweise an einem Zuviel an Geräuschen. Hochsensiblen bereiten Dinge wie Straßenlärm oder Interaktionen mit Menschen Stress.

Ich schätze, die Häufigkeit der Hochsensibilität liegt bei 1–3%.

MMW: *Wie können die Betroffenen ihr Problem in den Griff bekommen?*

Hochsensible sind anders

1996 beschrieb die amerikanische Psychotherapeutin Elaine Aron erstmals die sog. „Highly Sensitive Person“. Aufgrund neurologischer Besonderheiten können hochsensible Menschen Informationen schlechter filtern, was zu einer Reizüberflutung führt. Was genau Betroffene im Einzelfall intensiver wahrnehmen (Gerüche, optische und akustische Eindrücke, eigene Gefühle oder die ihrer Mitmensche), ist unterschiedlich. Ob tatsächlich, wie immer wieder angegeben, 15–20% der Bevölkerung von dieser Eigenschaft betroffen sind, ist unter den Experten umstritten.

Falkai: Meist reicht ein Informationsgespräch aus. Entscheidend ist, die Leute mit ihren Beschwerden ernst zu nehmen. Wenn man ihnen erklärt, welche Mechanismen eine Rolle spielen, und sie verstehen, dass es eine Stressachse gibt, an der sie arbeiten können, genügt das häufig. Denjenigen, die sich seit Monaten mit ihren Problemen beschäftigen, kann man eine Kurzintervention von fünf bis zehn Stunden im Rahmen einer Gesprächs- oder Verhaltenstherapie empfehlen.

MMW: *Haben Hochsensible ein erhöhtes Risiko für andere psychische Störungen?*

Falkai: Dauerstress führt zu stressassoziierten Erkrankungen wie etwa dem Burn-out. Wenn Leute dauernd überreizt und an der Grenze sind, äußert sich die Überforderung unterschiedlich: Der eine entwickelt Kopfschmerzen, der andere Magenschmerzen, und bei einer kleinen Gruppe entsteht eine Belastungssituation, ein Risikostadium, das assoziiert ist mit einer beruflichen Überlastung. Halten die Belastungen an und ist eine gewisse Empfindlichkeit vorhanden, können auch Depressionen, somatoforme oder Angststörungen entstehen.

MMW: *Wie soll das Umfeld mit Hochsensiblen umgehen?*

Falkai: Man sollte Hochsensible nicht in Watte packen. Bedauern ist nicht angebracht. Wenn klar ist, was der Betroffene kann und was nicht, kann die Umgebung so eingerichtet werden, dass möglichst wenige spezifische Stressfaktoren wirken.

Interview: Dr. Christine Starostzik

Nurses' Health Study

Psoriasis macht depressiv

— Frauen mit einer Psoriasis haben ein erhöhtes Depressionsrisiko. Dies ergab eine Auswertung der Nurses' Health Study (NHS) mit 51.000 Frauen. Von den ausgewählten Frauen hatten 935 (1,8%) im Jahr 2000 eine Psoriasis. 156 von ihnen (17%) waren in den folgenden acht Jahren erstmals depressiv geworden. Insgesamt lag die Inzidenz bei 1,55% pro

© hriana / Fotolia

Jahr, bei den Frauen ohne Psoriasis waren es 1,23%. Die Depressionsinzidenz war damit bei den Frauen mit Psoriasis um 38% höher als bei denjenigen ohne. Wurden Begleitfaktoren wie BMI, körperliche Aktivität, Alter und Tabakkonsum berücksichtigt, dann ließ sich zwar noch eine signifikante, aber nur noch um 29% erhöhte Depressionsrate feststellen.

Gesellte sich zur Psoriasis noch eine Arthritis, dann lag die Inzidenz von Depressionen bei 2,02% pro Jahr und war damit um 70% höher als bei Frauen ohne solche Probleme. Wurden Begleitfaktoren berücksichtigt, berechnete sich noch ein 52% erhöhtes Risiko.

■ Mut

■ Dommasch, E. D. et al. *BJD* 2015; online 24. Sept. 2015; doi: 10.1111/bjd.14032