Schwere atopische Dermatitis

Antikörper revolutionieren die Therapie

Die antiinflammative Therapie per Antikörper verspricht hohe Erfolgsraten bei mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis.

— Prof. Dr. Dr. Thomas Luger, Münster, berichtete von neuen Entwicklungen in der antiinflammativen dermatologischen

Atopisches Ekzem an der Achsel.

© Tanelian / SPL / Agentur Focus

Therapie. Der Interleukin(IL)-4/IL-13-Antikörper Dupilumab zeigte seinen Ausführungen nach eine bemerkenswerte Wirksamkeit bei mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis, die mit der von Cyclosporin vergleichbar ist, wobei die Wirkung der gut verträglichen Therapie innerhalb einer Woche einsetzt. In einer zwölfwöchigen Phase-III-Studie erreichten 85% der Patienten in der Dupilumab-Gruppe, aber nur 35% in der Placebo-Gruppe, eine 50%ige Reduktion des Werts nach dem Eczema Area and Severity Index (EASI, $p < 0,001$). Eine vollständige oder fast vollständige Reduktion der Hautsymptome (EASI 0 oder

1) erreichten mit Dupilumab 40%, mit Placebo 7% der Patienten ($p < 0,001$), und der Pruritus-Score sank in den beiden Gruppen um 55,7% vs. 15,1% ($p < 0,001$). Es kam unter der Antikörpertherapie gelegentlich zu Kopfschmerzen und Nasopharyngitis, aber zu keiner ausgeprägten Immunsuppression, keiner Nierentoxizität und keinem Effekt auf den Blutdruck [Beck LA et al. N Engl J Med. 2014; 371:130–9]. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA prüft die Zulassung derzeit beschleunigt in einem „Fast-Track-Verfahren“.

■ fk

■ 4th Munich International Summer Academy of Practical Dermatology (ISA 2015), 28. 7.–1. 8. 2015, München

Atopische Dermatitis

Probiotika in der Primärprävention

Mit Probiotika ist es offenbar möglich, der atopischen Dermatitis vorzubeugen. Einer rumänischen Metaanalyse zufolge genügt die Supplementation in den ersten Lebensmonaten allerdings nicht.

— Die Rolle von Probiotika in der Primärprävention der atopischen Dermatitis (AD) wird derzeit noch kontrovers diskutiert. Rumänische Hautärzte haben sich in einem systematischen Review einen Überblick über die Studienlage verschafft. Ausgewertet wurden 16 randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt 3.495 Probanden.

In der Metaanalyse zeigte sich insgesamt ein protektiver Effekt gegenüber der AD durch die prophylaktische Gabe von Probiotika (Odds Ratio, OR 0,64). Die Subgruppenanalysen für Probanden der Allgemeinbevölkerung und Studienteilnehmer mit erhöhtem Risiko für atopische Erkrankungen ergaben Vorteile für die Supplementation in beiden Gruppen (OR 0,53 bzw. OR 0,66).

Eine ausschließlich postnatale Probiotikagabe erwies sich allerdings als wirkungslos (OR 0,95), während durch die prä- und postnatale Zufuhr das AD-Risiko sank (OR 0,61). Außerdem stellten die Autoren fest, dass offenbar sowohl Lactobacillus-Monokulturen als auch eine Kombination aus Lactobacillus und Bifidobacterium einen gewissen Schutz vor der Entwicklung einer AD bieten (OR 0,70 bzw. OR 0,62).

Fazit: Werden Probiotika sowohl bereits während der Schwangerschaft als auch postnatal angewendet, bieten sie einen gewissen Schutz vor der Entwicklung einer AD – unabhängig vom Allergierisiko des Kindes. Interessanterweise ist eine probiotische Supplementation in der Primärprävention offenbar nur

AD quält schon die Kleinsten.

© Boddy / SPL / Agentur Focus

dann wirksam, wenn sie sowohl in den letzten Wochen der Schwangerschaft als auch in den ersten Lebensmonaten des Kindes verabreicht wird.

■ st

■ Panduru M et al. JEADV 2015;29:232–42