Fälle aus der Praxis

Was sagen die Leitlinien?

Leitlinien können die Versorgung vieler Patienten erleichtern – ohne allerdings bindend zu sein. Immer müssen sie dem Einzelfall angepasst werden. In unserem neuen Modul wollen wir deshalb Leitlinien nicht einfach schematisch „herunterbeten“. Vielmehr wird an Einzelbeispielen versucht, eine evidenzbasierte Lösung zu finden. Wir laden auch Sie ein, eigene Patienten vorzustellen, bei denen sich die Frage stellt: Was sagen die Leitlinien? (Fragen an: brigitte.moreano@springer.com)

Was tun bei Reizdarm?

© absolutimages - Fotolia

Hinter Durchfall und Verstopfung können viele Ursachen stecken.

Fällen auch die Sonografie und die Ileokoloskopie (Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke 1) stattfinden.

Bzgl. der Therapiemaßnahmen gibt es keine allgemeinen ernährungsbezogenen Empfehlungen, doch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten empfiehlt sich eine gezielte Eliminationsdiät. Ausgewählte Probiotika können eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für lösliche Ballaststoffe, die bei Patienten mit Diarrhöen oder Schmerzen sinnvoll sind (Evidenzgrad B, Empfehlungsstärke 1). Auch kann eine Therapie mit trizyklischen Antidepressiva oder SSRI erfolgen. Bei Schmerzen und Blähungen sind auch Phytotherapeutika ein sinnvoller Therapieansatz (Evidenzgrad A, Empfehlungsstärke 1).

▪ http://www.dgvs.de/fileadmin/user_upload/Leitlinien/Reizdarmsyndrom/Leitlinie_Reizdarmsyndrom.pdf

? Eine 49-jährige Patientin klagt seit einigen Monaten über wiederholt auftretende Bauchschmerzen, die nach der Defäkation besser werden. Manchmal sei sie obstipiert, gelegentlich habe sie auch Durchfälle. Keine Gewichtsabnahme, kein Blut im Stuhl, keine positive Familienanamnese für Kolonkarzinom. Eigentlich spricht alles für ein Reizdarm-Syndrom. Ist eine weitere diagnostische Abklärung sinnvoll? Was sagen die Leitlinien zur Behandlung und zu Phytopharmaka?

! Nach der Leitlinie sollen für die Diagnosestellung zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Anamnese, Muster und Ausmaß der Beschwerden sind mit einem Reizdarm vereinbar.
- Die Sicherung des Reizdarmsyndroms erfordert den symptomabhängig gezielten Ausschluss relevanter Differenzialdiagnosen. Dazu gehören entzündliche bzw. infektiöse Erkrankungen, Maldigestion, z. B. Laktoseintoleranz und das Kolonkarzinom (Evidenzgrad B, Empfehlungsstärke 2). Als Untersuchungen sollten ein Basislabor mit Blutbild, CRP, Leberwerten, Lipase, TSH, Stuhlmikrobiologie, Zöliakie-Antikörper (Evidenzgrad B, Empfehlungsstärke 2) und in den meisten

Mehr zum Thema

Da die Ursachen und die Behandlungsansätze des Reizdarmsyndroms sehr vielschichtig sind, kann hier nur auf die wichtigsten Eckpfeiler der Diagnostik und Therapie hingewiesen werden. Wichtig ist das Bewusstsein, dass sowohl somatische als auch psychosoziale Faktoren Einfluss auf die Symptomatik nehmen können. Der Patient sollte hierüber in Kenntnis gesetzt werden und somit die Möglichkeit erhalten, selbst zur Besserung beizutragen. Weitere hilfreiche Therapieempfehlungen finden Sie in der MMW 13/2015 „Was beim Reizdarmsyndrom hilft“ oder unter springermedizin.de/5851916.