DIE ERSTE SEITE

Dr. med.
Brigitte Moreano
Stellvertretende
Chefredakteurin
brigitte.moreano@
springer.com

Gefahr hinterm Lenkrad

Synkope erhöht Risiko für späteren Verkehrsunfall

Patienten, die eine Synkope erleiden, sind in der Folgezeit auffällig häufig in Unfälle mit Kraftfahrzeugen verwickelt. In einer Kohortenstudie wurden Daten von mehr als 4 Mio. Dänen analysiert. Rund 41.000 von ihnen hatten zwischen 2008 und 2012 eine erste Synkope erlitten. In den folgenden zwei Jahren waren 4,4% von ihnen an einem Verkehrsunfall beteiligt und muss-

ten ärztlich versorgt werden. Die Inzidenzrate lag mit 20,6 pro 1.000 Personenjahre (PJ) fast doppelt so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung (12,1/1.000 PJ). Auf fünf Jahre berechnet lag die Unfallquote nach Synkope bei 8,2% im Vergleich zu 5,1% im Bevölkerungsdurchschnitt.

■ JAMA Intern Med 2016, online 29. Februar; doi: 10.1001/jamainternmed.2015.8606

Möglicher Vorläufer

Vom chronischen Schnupfen zum Karzinom?

Chronische Sinusitiden bereiten möglicherweise den Boden für Nasopharynxkarzinome, so das Ergebnis einer Metaanalyse. In fünf retrospektiven Fall-Kontroll-Studien waren 4.274 Patienten mit Nasopharynxkarzinom mit 446.059 Kontrollpersonen verglichen worden. Bei Patienten mit sinuassaler Entzündung in der

Vorgeschichte wurde mit höherer Wahrscheinlichkeit Krebs im Nasopharynx diagnostiziert (OR 2,39). Auch Patienten mit allergischer Rhinitis hatten ein erhöhtes Risiko. Zur Bestätigung dieses Zusammenhangs sind prospektive Studien nötig.

■ Otolaryngol Head Neck Surg 2016, online 23. Februar; doi: 10.1177/0194599816629436

Unerwünschte Fillerreaktionen

Schönheitsspritze kann unschöne Folgen haben

Der Effekt von Fillerinjektionen fällt manchmal anders aus als beabsichtigt: Statt Falten zu korrigieren werden Sorgenfalten noch vermehrt. Die Lebensqualität kann darunter erheblich leiden, wie Dermatologen der Berliner Charité mit Hilfe der „Injectable Filler Safety“ (IFS)-Studie festgestellt haben. In diesem Fallregister werden unerwünschte Wirkungen von injiziertem Fillermaterial bundesweit erfasst. Insgesamt hatten 104 Teilnehmer 260 Fillerbehandlungen vornehmen lassen. 614 unerwünschte Reaktionen traten auf. Vor allem Fremdkörpergranulome waren zu verzeichnen (knapp 30% der Nebeneffekte), gefolgt von Schwellungen (20%) und Erythemen bzw. Entzündungen (16%). Die Einbußen an Lebensqualität, die hierdurch verursacht wurden, waren erheblich: 24% der Betroffenen gaben an, stark beeinträchtigt zu sein, bei weiteren gut 13% war die Lebensqualität sogar sehr stark reduziert.

■ J Eur Acad Dermatol Venereol 2016; online 25. Februar; doi: 10.1111/jdv.13594

Aggressive Blutdrucksenkung Bei Diabetikern eher schädlich

Seit der Publikation der SPRINT-Studie wird wieder über strengere Ziele für die Blutdrucksenkung diskutiert. Diabetiker scheinen von einer aggressiven Therapie jedoch keinen Nutzen zu haben – im Gegenteil. Nach einer Metaanalyse schwedischer Wissenschaftler besteht bei Patienten mit Typ-2-Diabetes ein J-förmiger Zusammenhang zwischen Blutdruck und kardiovaskulären Ereignissen. Der Scheitelpunkt dürfte ungefähr bei einem systolischen Ausgangsdruck von 140 mmHg liegen. Bei Werten darüber führt eine antihypertensive Therapie zu einem Rückgang von kardiovaskulären Erkrankungen und Gesamtmortalität. Darunter geht sie mit einem Wiederanstieg der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit einher.

In die Analyse wurden randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt fast 74.000 Teilnehmern und einer mittleren Dauer von 3,7 Jahren eingeschlossen.

■ BMJ 2016;352:i717