Fälle aus der Praxis

Was sagen die Leitlinien?

Leitlinien können die Versorgung vieler Patienten erleichtern – ohne allerdings bindend zu sein. Immer müssen sie dem Einzelfall angepasst werden. In diesem Modul wollen wir deshalb Leitlinien nicht schematisch „herunterbeten“. Vielmehr wird an Einzelfällen versucht, eine evidenzbasierte Lösung zu finden. Wir laden auch Sie ein, eigene Patienten vorzustellen, bei denen sich die Frage stellt: Was sagen die Leitlinien? (Fragen an: brigitte.moreano@springer.com)

Gicht: Immer Gelenkpunktion und Colchicin?

? Ca. alle vier Wochen wird in meiner Praxis ein Patient mit einer akuten Arthritis vorstellig, wobei ich die Diagnose „Gicht“ im Allgemeinen klinisch stelle. Reicht das oder sollte immer das Gelenk punktiert werden? Und ist Colchicin noch das Mittel der Wahl beim akuten Gichtanfall? Was empfehlen die Leitlinien?

! Die Gicht ist eine autoinflammatorische Erkrankung, ausgelöst durch Harnsäurekristalle. Dabei handelt es sich um die häufigste Arthritis überhaupt. Die Prävalenz liegt bei 1–2%. Der Goldstandard bei der Diagnosestellung ist die Gelenkpunktion mit Nachweis von Harnsäurekristallen. Mit der Punktion kann auch eine septische Arthritis, die immer differenzialdiagnostisch zu diskutieren ist, definitiv ausgeschlossen werden. Allerdings ist eine solche Punktion nur bei untypischen Fällen indiziert.

Auch in der Leitlinie wird von einer diagnostischen Gelenkpunktion in der Hausarztpraxis abgeraten. Typisch für

einen Gichtanfall ist die schmerzhafte Monarthritis, die sich innerhalb eines Tages ohne Prodromi entwickelt. Befallen ist meist ein peripheres kleines Gelenk, vorrangig das Großzehengrundgelenk (Podagra). Ein Trauma oder eine intraartikuläre Injektion sollten ausgeschlossen sein. Passt alles zusammen, so genügt die klinische Diagnosestellung, zumal die Harnsäure gerade im akuten Gichtanfall nicht immer erhöht ist.

Antientzündliche Therapie plus Harnsäuresenkung

Für die Therapie des akuten Gichtanfalls stehen NSAR, Colchicin und systemisches Prednisolon zur Verfügung. Colchicin wird heute nicht mehr unbedingt als Therapie der ersten Wahl angesehen. Wirksamer und verträglicher sind 40 mg Prednisolon über fünf Tage oder NSAR, z. B. 2 x 500 mg Naproxen, oder die Kombination NSAR plus 10 mg Prednisolon. Bei Colchicin empfiehlt sich eine kurze, niedrig dosierte Gabe, von zunächst 1 mg und eine Stunde später nochmals 0,5 mg, ab dem 2. Tag 2 x 0,5 mg. Bei einer Nieren- oder Leberinsuffizienz ist eine Dosisanpassung nötig. Die Therapie des akuten Gichtanfalls sollte bis zum Abklingen der Symptomatik fortgeführt werden, maximal jedoch zwei Wochen.

Um Rezidive zu verhindern, sollte auch eine Harnsäure-senkende Medikation eingeleitet werden mit dem Ziel, den Harnsäurewert auf < 360 µmol/l zu senken. Eine Diät ist nur bei Patienten mit erhöhter Purinzufuhr sinnvoll. Wirksame Medikamente sind Xanthinoxidase-Inhibitoren (Allopurinol und Febuxostat) und Substanzen, die die Ausscheidung erhöhen (Probenecid und Benzbromaron).

Bei Gabe von Allopurinol sollte man mit 100–300 mg täglich beginnen und ggf. die Dosis auf max. 900 mg täglich steigern. Bei chronischer Niereninsuffizienz besteht ein erhöhtes Risiko für Hautreaktionen, deshalb sollte man mit 1,5 mg pro geschätzter Einheit GFR beginnen. Febuxostat hat den Vorteil, dass es renal und hepatisch eliminiert wird und deshalb bei einer Niereninsuffizienz keine Dosisanpassung erforderlich ist.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Harnsäure nicht im akuten Schub zu bestimmen, da dann die Werte falsch niedrig sein können. Eine vorbestehende Allopurinol-Therapie sollte man im Schub nicht absetzen. Allerdings kann eine Harnsäureabsenkung auch Schübe auslösen. Mit der Harnsäure-senkenden Medikation sollte sofort nach Abklingen des Schubs begonnen werden. Bei einer asymptomatischen Hyperurikämie besteht keine Indikation für eine Harnsäure-senkende Therapie.

Dr. Peter Stiefelhagen

■ www.awmf.org/leitlinien/detail/II/053-032b.html

Podagra: hochschmerzhafte Gelenkschwellung.

© Ziga Lisjak / iStock.com