Hohes Potenzial

Neuer Therapieansatz in der Hepatologie

— „Wir glauben, dass dies ein Durchbruch in der Behandlung der PSC sein könnte“, so die Einschätzung von Prof. Dr. Michael Trauner, Wien, mit Blick auf eine Studie zum Einsatz von norUrsodesoxycholsäure (norUDCA) bei primär sklerosierender Cholangitis (PSC). Die spannenden Ergebnisse wurden auf dem Internationalen Leberkongress der European Association for the Study of the Liver (EASL) präsentiert. Doch die Substanz hat noch mehr Potenzial.

UDCA bei PBC etabliert

UDCA (Ursofalk®) ist als Standardtherapie bei primär biliärer Cholangitis (PBC) längst etabliert. Etwa zwei Drittel der Patienten zeigen ein biochemisches Ansprechen und können von einer annähernd normalen Lebenserwartung

ausgehen. Bei PSC zeigt UDCA dagegen keine überzeugende Wirksamkeit.

Kleine Modifikation – große Wirkung

Das scheint sich durch eine kleine chemische Modifikation, die Verkürzung einer Seitenkette, zu ändern. NorUDCA wird in der Leber gehalten und kann direkt auf die entzündeten Gallengänge wirken. Tierexperimentell zeigten sich ausgeprägte anticholestatische, antifibrotische und antiinflammatorische Effekte.

„NorUDCA stellt als Modifikation der UDCA einen vielversprechenden neuen Therapieansatz dar und unterscheidet sich von UDCA durch ihre besonderen physikochemischen Eigenschaften. Sie führen zu einer bikarbonatreichen Cholerese, die für die protektiven Effekte verantwortlich ist.“

Auch gegen die Fettleber?

Neben der PSC sieht Trauner weitere Indikationen für norUDCA. Präklinische Daten, die eine Verbesserung der Fettleber zeigen, die von deutlichen antiatherosklerotischen Effekten begleitet werden, prädestinieren nach Trauner die modifizierte UDCA auch für die Therapie der nicht-alkoholischen Fettleber (non alcoholic fatty liver disease, NAFLD). Eine multizentrische Studie ist bereits auf den Weg gebracht. Zudem sieht Trauner norUDCA auch als mögliche Option bei Patienten mit PBC, die auf die etablierte Standardtherapie nicht ansprechen.

Dr. Beate Fessler

■ Pressegespräch „Leber- und Darmerkrankungen – besser verstehen, gezielter behandeln“; Innsbruck, März 2016 (Veranstalter: Falk)

Basalinsulin mit konstantem Wirkprofil

Weniger nächtliche Hypoglykämien

— Prof. Robert Ritzel, München, rät, bei der Therapie von Diabetikern Basalinsuline mit langer Halbwertszeit einzusetzen, um das Risiko für Hypoglykämien gering zu halten. Seit einem Jahr stehe mit Insulin glargin U300 (300 E/ml, Toujeo®) so ein Basalinsulin zur Behandlung von Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes zur Verfügung.

Durch die dreifach höhere Konzentration im Vergleich zu Insulin glargin U100 reduziere sich das zu injizierende Volumen und nach der Injektion bilde sich ein subkutanes Depot, das Insulin langsam freisetze. Durch die verlängerte Halbwertszeit werde ein über mehr als 24 Stunden anhaltendes, flacheres und konstanteres Wirkprofil erreicht. Die veränderte Pharmakokinetik offenbare sich auch in klinischen Vorteilen, wie das EDITION-Studienprogramm I–III zeigte. Es verglich die Wirksamkeit von Insulin glargin U300 und U100 bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Nach 12 Monaten ergab sich für Insulin glargin U300 eine

bessere Senkung des HbA_{1c}-Wertes als unter Insulin glargin U100. Die Rate nächtlicher schwerer oder bestätigter Unterzuckerungen war um 25% geringer als unter Insulin glargin U100, das Risiko für Hypoglykämien zu jeder Tageszeit um 9% reduziert [Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015]. Darüber hinaus biete das hoch dosierte Insulin den Patienten Flexibilität, denn es könne innerhalb eines Zeitfensters von sechs Stunden injiziert werden. Es eigne sich laut Ritzel auch für Diabetiker mit Nephropathie oder ältere Patienten, die besonders auf stabile Glukosespiegel angewiesen seien.

Herzrhythmusstörung bis Demenz

Schwere Hypoglykämien erhöhen das Risiko für Herzrhythmusstörungen, fördern arteriosklerotische Prozesse und steigern das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, erklärte Prof. Werner Kern, Ulm. Zudem beeinträchtigten sie langfristig die kognitive Leistungsfähigkeit und erhöhten das Risiko für eine späte-

Gerade ältere Patienten können Hypoglykämien oft nicht richtig einordnen.

re Demenz. Leichte und nächtliche Unterzuckerungen bemerke der Patient oft nicht – diese minderten aber Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit.

Susanne Pickl

■ Fachpressekonferenz „Herzlichen Glückwunsch – 1 Jahr Insulin glargin U300“, 51. Diabetes Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG); Berlin, Mai 2016 (Veranstalter: Sanofi-Aventis)