DIE ERSTE SEITE

Dr. med.
Brigitte Moreano
Stellvertretende
Chefredakteurin
brigitte.moreano@
springer.com

Ernährungsmedizin

Gicht durch zu viel Fruchtzucker

Fruktose wird heute nicht nur über Obst und Fruchtsäfte konsumiert, sondern zu großen Teilen auch über industriell gefertigte Nahrungsmittel. Das könnte kanadischen Ärzten zufolge einer der Gründe sein, warum die Zahl der Gichtpatienten seit Jahren zunimmt. Auch die Ergebnisse verschiedener Studien weisen in diese Richtung. Fruktose führt u. a. über eine ATP-Depletion zur Anreicherung von

Inosinmonophosphat, einem Vorläufermolekül der Harnsäure. Die durch den ATP-Mangel angeregte kompensatorische Synthese von Purinnukleotiden kann die Harnsäureproduktion zusätzlich steigern. Daher gilt es, nicht nur purinhaltige und industriell gefertigte Fertignahrung zu meiden, sondern auch bei Obst und Fruchtsäften Vorsicht walten zu lassen.

■ Jamnik J et al. *BMJ Open*. 2016;6:e013191

Gesunde Menschen

Wenige Tage Bettruhe fördern Insulinresistenz

Eine Woche strikte Bettruhe führt nicht nur zur Muskelatrophie, sondern senkt darüber hinaus die Insulinsensitivität, ohne zugleich die Lipidakkumulation in den Muskeln zu erhöhen. Das hat eine Studie an zehn jungen, gesunden, künstlich immobilisierten Männern ergeben. Während

der sieben Tage verloren sie $1,4 \pm 0,2$ kg an fettfreier Muskelmasse, am Tag also etwa 200 g. Die Ganzkörper-Insulinsensitivität sank um $29 \pm 5\%$, was mit $p < 0,01$ einen signifikanten Unterschied im Vergleich zum Studienbeginn darstellte.

■ *Diabetes*. 2016;65:2862–75

Arbeitsmedizin

Harte Maloche schützt nicht vor Herzinfarkt

Während die kardiovaskuläre Schutzwirkung von sportlichen Aktivitäten in der Freizeit gut belegt ist, gibt es widersprüchliche Beobachtungen zur Wirkung von körperlicher Arbeit. Schwedische Ärzte wollten deswegen den Beweis antreten, dass körperliche Aktivität auch im Job protektiv wirkt – und scheiterten.

Sie rekrutierten 9.961 Berufstätige und differenzierten sie nach der Art ihrer Arbeit. In Gruppe 1 gingen die Probanden mehr als 50% der Zeit einer sitzenden Tätigkeit nach, in Gruppe 2 wurde überwiegend im Stehen und im Gehen gearbeitet, in Gruppe 3 wurden Gegenstände gehoben und getragen. Nach 13 Jahren Beobachtungszeit ergab sich in allen Gruppen das gleiche Herzinfarktrisiko. Die Forscher vermuten, dass körperliche Arbeit nicht die Fitness verbessert, sondern eher das kardiovaskuläre System überlastet.

■ *BMJ Open*. 2016;6:e012692

Gravidität

Übelkeit und Erbrechen zeigen niedriges Fehlgeburtsrisiko an

Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft werden schon lange als gutes Zeichen für den Verlauf erachtet. Auch epidemiologische Studien deuteten bei früher Übelkeit auf ein reduziertes Risiko für eine Fehlgeburt hin. Problematisch ist dabei, dass Frühaborte vor der Einnistung häufig nicht bemerkt werden. Auch sind retrospektiv erhobene Angaben zur Übelkeit unzuverlässig.

Daher werteten Hinkle und Kollegen Tagebucheinträge zu Übelkeit und Erbrechen aus, die 1.200 Frauen, die schwanger waren oder es werden wollten, im Rahmen einer anderen Studie gemacht hatten. Wie sich zeigte, ereignete sich bei Frauen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Übelkeit empfanden, nur halb so oft ein Abort in derselben

Woche wie bei Frauen ohne Übelkeit. Bei Frauen, die sich erbrechen mussten, war die Abortrate in der jeweiligen Woche sogar um 75% reduziert. Der Zusammenhang zeigte sich sowohl für den Periimplantationsabort als auch für eine spätere Fehlgeburt, wenngleich er nur bei Letzterer ein statistisch signifikantes Niveau erreichte.

Weshalb Schwangeren übel wird, bleibt unklar. Die Forscher vermuten hCG und andere Schwangerschaftshormone als Auslöser. Ein Ausbleiben der Übelkeit könnte auf einen Hormonmangel hindeuten.

■ *JAMA Intern Med* 2016, online 26. September; doi: 10.1001/jamainternmed.2016.5641