Stabile Angina pectoris

Schwere der Erkrankung sinkt, Lebensqualität steigt

Solche Attacken sollten tunlichst vermieden werden.

© Michael Möller / panthermedia

— Die stabile Angina pectoris (AP) ist eine häufige Manifestation der chronisch ischämischen Herzkrankheit. Ziel einer leitliniengerechten medikamentösen Therapie ist die Linderung der ischämischen Symptome und die Vermeidung kardiovaskulärer Ereignisse.

Dass das Antianginosum Ranolazin (Ranexa®) unter Alltagsbedingungen eine effektive antiischämische Behandlungsoption für Patienten mit stabiler Angina pectoris unterschiedlicher Ursache darstellt, bestätigen die aktuellen Ergebnisse der Beobachtungsstudie ARETHA [Diedrichs H et al. J Clin Exp Cardiol. 2015;6:12]. Unter Ranolazin wurde die wöchentliche Rate der AP-Attacken signifikant um 74,5% ($p < 0,0001$) gesenkt. Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten (69%) verbesserte sich zudem die Belastbarkeit bei Angina pectoris.

Im Rahmen von ARETHA wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Ranolazin unter Alltagsbedingungen an 1.537 Patienten mit stabiler Angina pectoris untersucht. Die empfohlene Anfangsdosis von Ranolazin beträgt 2×375 mg/d. Nach 2–4 Wochen sollte die Dosis auf 2×500 mg/d erhöht werden und, abhängig vom Ansprechen des Patienten, danach weiter auf die empfohlene Maximaldosis von 2×750 mg/d angepasst werden.

Die Herz-Kreislauf-Medikation, die die Patienten bis zu diesem Zeitpunkt erhalten hatten, wurde beibehalten.

Signifikante Senkung der AP-Häufigkeit

Im Verlauf der Studie zeigte sich eine signifikante und klinisch relevante Reduktion der Angina-pectoris-Symptome. Die mittlere Anzahl der AP-Anfälle pro Woche konnte signifikant von im Mittel 4,4 auf 1,1 ($p < 0,0001$) verringert werden. Analog dazu verringerte sich der Bedarf an kurzwirksamen Nitraten zur symptomatischen Anfallstherapie um 76% ($p < 0,0001$).

„Die Untersuchung dieser Parameter ist klinisch höchst relevant, denn im Alltag sind Patienten häufig eher an einer Verbesserung ihrer Lebensqualität als an einer marginalen Mortalitätsreduktion interessiert“, erklärte Prof. Harald Darius, Chefarzt des Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin.

Red.

▪ Nach Informationen von Berlin-Chemie

Hypertonie

Kampagne mit Patientenbildern

— In der Kampagne „Alles unter Kontrolle“ zur Blutdrucksenkung setzt Novartis unterschiedliche Hypertoniepatienten stressigen Alltagssituationen aus. Da geht es um einen Kindergeburtstag, der für den 70-jährigen Opa zur Belastung werden kann, oder um eine typische Situation in einem Großraumbüro: sämtliche Mitarbeiter telefonieren gleichzeitig. Ein drittes Beispiel ist eine scheinbare Alltagssituation in der Küche einer Patientin, die aus dem Ruder läuft.

Doch die drei Hypertoniepatienten blieben in den Situationen erstaunlich ruhig. Denn ihr Blutdruck sei leitliniengerecht eingestellt worden – durch die Dreifach-Kombination aus Amlodipin/Valsartan/HCT (Exforge HCT®), teilt

das Unternehmen mit. Das Kombi-Präparat ermögliche eine starke Blutdrucksenkung, erhöhe die Compliance durch weniger Tabletten und sei vollständig kardioprotektiv (nachgewiesen für Valsartan).

Ob die zusätzliche Senkung des systolischen Blutdrucks von 140 mmHg auf 120 mmHg für Nicht-Diabetiker mit hohem kardiovaskulären Risiko, die bisher keinen Schlaganfall erlitten haben, sinnvoll ist, untersuchte die SPRINT-Studie. Experten diskutieren noch, ob und inwieweit die aktuelle Leitlinie aufgrund dieser Ergebnisse angepasst werden muss.

Red.

▪ Nach Informationen von Novartis

Kurz notiert

Neues schmerztherapeutisches Fortbildungskonzept

→ Mit dem Ziel, die schmerztherapeutische Versorgung in Deutschland flächendeckend zu verbessern und den betroffenen Patienten Lebensqualität zurückzugeben, haben die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) und der Holzkirchner Arzneimittelhersteller Hexal ihre Kompetenzen gebündelt und das Fortbildungskonzept „MENSCH – Masterclass. Education. SCHmerz“ entwickelt. Hier wird ein neuer Weg beschritten: Zum ersten Mal werden Ärzte und Apotheker integriert – sowohl bei der Entwicklung der Inhalte als auch bei der Präsentation der Themen. Im Rahmen regionaler Veranstaltungsreihen soll deutschlandweit möglichst vielen Allgemeinärzten und Apothekern die kostenlose Teilnahme an dem modular aufgebauten Fortbildungsprogramm ermöglicht werden.

Red.

▪ Nach Informationen von Hexal