Infektion mit Rhinoviren

Einsame Menschen haben schlimmeren Schnupfen

Wer sich einsam fühlt, leidet stärker unter den Symptomen von Schnupfen und Erkältung. Das haben Forscher aus Texas herausgefunden. Wie eng geknüpft das soziale Netz tatsächlich ist, scheint dabei weniger wichtig zu sein.

Wer allein ist, leidet mehr.

© JPCGutenberg/UK Ltd / Getty Images / iStock

— Forscher der University of Houston und der Rice University befragten 213 Probanden mithilfe psychologischer Fragebögen nach deren Lebensumständen und besonders nach der Stärke des Einsamkeitsgefühls. Anschließend trüffelten die Wissenschaftler den Probanden Tropfen mit Rhinoviren vom Typ RV39 in die Nase. Sodann wurden die infizierten Studienteilnehmer fünf Tage lang unter Quarantäne gestellt, wo sie über ihre Schnupfenbeschwerden Buch zu führen hatten.

Es zeigte sich, dass bereits das zuvor erhobene Ausmaß des Einsamkeitsemp-

findens eine Vorhersage erlaubte, wie stark die Betroffenen unter dem vorsätzlich herbeigeführten Schnupfen leiden würden. Je einsamer sich jemand fühlte, desto heftiger und belastender empfand er die Schnupfensymptome. Die Wahrnehmung von Einsamkeit war enger mit dem Leiden an der Krankheit verknüpft als eine objektiv festzustellende soziale Isolation.

„Psychosoziale Parameter wie Einsamkeitsgefühle zu beurteilen, könnte Ärzten zu verstehen helfen, wie ihre Patienten eine akute Erkrankung erleben“, meinen LeRoy und Kollegen.

— rb

▪ LeRoy AS et al. Health Psychol 2017;36:512–520

Erwachsene ohne Zöliakie

Gluten-Verzicht schützt nicht vor Herzinfarkt

Eine glutenarme Ernährung geht bei Menschen ohne Zöliakie nicht mit einem reduzierten KHK-Risiko einher.

— Zöliakiekranken müssen Gluten vermeiden; unter der notwendigen Diät sinkt auch ihr KHK-Risiko. Der Zusammenhang ist jedoch nicht auf Menschen ohne Zöliakie übertragbar. In zwei Langzeitstudien mit 110.000 Teilnehmern hatten diejenigen, die am meisten Gluten zu sich nahmen, nicht mehr Herzinfarkte als diejenigen mit dem geringsten Glutenkonsum. Die Studienautoren sehen sogar eher die glutenarme Diät mit einem hö-

heren kardiovaskulären Risiko behaftet – weil sie den Verzehr von Vollkornprodukten reduzieren kann.

Die Analyse beruht auf Daten, die bei 64.700 Frauen der Nurses' Health Study und bei 45.300 Männern der Health Pro-

essionals Follow-up Study prospektiv erhoben worden waren. Die Teilnehmer hatten während der 26-jährigen Beobachtungszeit alle vier Jahre Auskunft über ihre Ernährung gegeben. Bei 6.529 der zunächst herzgesunden Frauen und Männer wurde in dieser Zeit ein Herzinfarkt diagnostiziert, 2.286 verliefen tödlich.

Wurden KHK-Risikofaktoren mitberücksichtigt, etwa Alter, BMI, NSAR- und Statintherapien, Alkoholkonsum, Rauchen, Cholesterin und Blutdruck, ergab sich keinerlei Zusammenhang zwischen Glutenverzehr und KHK-Risiko.

— bs

▪ Lebowitz B et al. BMJ 2017;357:j1892

© Olga Mitsova / Getty Images / iStock

Verzicht auf Vollkorn erhöht das Herzkrisiko.