Neuer Wirkstoff in der Leukämietherapie in Sicht

Derzeit befindet sich der selektive Polonin-Kinase-Inhibitor Volasertib in der klinischen Entwicklung. In einer offenen Phase-II-Studie wurden 87 Erwachsene mit akuter myeloischer Leukämie (AML) eingeschlossen, für die eine intensive Induktionschemotherapie nicht infrage kam, und die entweder zu einer Therapie mit Volasertib plus Low-Dose Cytarabin (LDAC, $n = 42$) oder zu einer LDAC-Monotherapie ($n = 45$) randomisiert wurden. Im Kombinationsarm erreichten 31 % der Patienten (13 von 42) ein objektives Ansprechen (komplette Remission [CR] oder CR mit unvollständiger Blutbildnormalisierung). Mit der Monotherapie ließ sich ein objektives Ansprechen nur bei 13,3 % der Patienten (6 von 45) nachweisen. *red*

Nach Informationen von Boehringer Ingelheim

Anämie im Rahmen von Tumorerkrankungen

Die Anämie gehört zu den häufigsten Begleiterkrankungen von Tumorpatienten. In den meisten Fällen liegt der Anämie jedoch eine entzündungsbedingte Störung der Eisenresorption sowie des Eisenmetabolismus zugrunde. Mit einer i. v.-Eisengabe lässt sich unter den Bedingungen der Praxisroutine eine gute Anämiekorrektur erreichen. Dies zeigen die Ergebnisse einer zwölfwöchigen nicht interventionellen Studie an mehr als 600 anämischen Tumorpatienten, die in 68 hämatologischen bzw. onkologischen Praxen in Deutschland behandelt wurden [Steinmetz T et al. Ann Oncol. 2012;doi:10.1093/annonc/mds338]. Ein Viertel der Patienten hatte vor Studienbeginn eine antianämische Therapie erhalten, überwiegend mit Bluttransfusionen (13,3 %) und Erythropoese-stimulierenden Agenzien (ESAs) (8,3 %). Eisencarboxymaltose (ferinject®) wurde nach dem Ermessen der behandelnden Ärzte ohne Dosis- und Häufigkeitsbeschränkungen verabreicht. Eine zusätzliche Anwendung von ESAs war zulässig. Das Hb normalisierte sich unabhängig vom Ausgangs-Hb-Wert innerhalb von 5–12 Wochen auf 11–12 g/dl. 93 % der Studienteilnehmer waren nach fünf Wochen transfusionsfrei. Die Behandlung mit i. v. Eisencarboxymaltose wurde gut vertragen. *red*

Nach Informationen von Vifor Pharma

Antiangiogenese beim Ovarialkarzinom

— Mit der Zulassungserweiterung von Bevacizumab für die Behandlung des platin-sensitiven Ovarialkarzinomrezidivs können nun auch Patientinnen, die in der Primärtherapie keinen VEGF-Inhibitor erhalten haben, von der Angiogenesehemmung profitieren. Die Phase-III-Studie OCEANS zeigte anhand von 484 Patientinnen mit platin sensitivem Rezidiv eine signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens (PFS), wenn Bevacizumab (Avastin®) zusätzlich zur Standardtherapie Carboplatin/Gemcitabin gegeben wurde (medianes PFS 12,4 vs. 8,4 Monate; HR 0,484; $p < 0,0001$). Entscheidend für eine möglichst lange Überlebenszeit beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom ist, so die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) OVAR, die Kombination von State-of-the-Art Operation und State-

of-the-Art Chemotherapie. Die zusätzliche Behandlung mit Bevacizumab kann in der Primärtherapie des Ovarialkarzinoms FIGO Stadium IIIB–IV erwogen werden. Sven Mahner, Hamburg-Eppendorf, verwies auf das onkologische Prinzip, die wirksamsten Substanzen so früh wie möglich einzusetzen. Bei Patientinnen mit schlechterer Prognose und in späteren Therapielinien scheine, so Mahner, die Wirkung der Chemotherapie nachzulassen, wohingegen Bevacizumab weiterhin aktiv bleibe. Dies sei aber kein Grund, Bevacizumab aufgrund der erweiterten Zulassung für spätere Linien „aufzuheben“. *Ine Schmale*

Pressekonferenz „Avastin® beim Ovarialkarzinom – Zulassungserweiterung für die Rezidivtherapie“, 27.11.2012, Frankfurt; Veranstalter: Roche

Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom: Weiterbehandlung mit Cabazitaxel

— Die Hinweise mehren sich, dass Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) und aggressiver Tumorbilologie bzw. schlechtem Ansprechen auf die vorangegangene Hormontherapie nach Docetaxel-Versagen vorzugsweise chemotherapeutisch mit Cabazitaxel weiterbehandelt werden sollten.

Nach wie vor ist nicht geklärt, wie Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom nach Versagen der First-Line-Behandlung mit Docetaxel am besten weiterbehandelt werden und wie die individuell beste Therapiesequenz aussieht, so der Urologe Stefan Machtens, Bergisch Gladbach.

Laut Machtens verdichten sich darüber hinaus die Hinweise, dass insbesondere bei Patienten mit aggressiver Tumorbilologie die Chemotherapie second-line mit Cabazitaxel (Jevtana®) fortgeführt werden sollte. Das sind z. B. Patienten mit hohem Gleason-Score (Gleason 8–10), einem schlechten PSA-Ansprechen auf die primäre Androgenblockade bzw. schnellem Progress (< 16 Monate) unter derselben sowie jene mit Progression bereits unter der First-Line-

Therapie mit Docetaxel. Bei diesen Patienten hat die chemotherapeutische Weiterbehandlung mit Cabazitaxel laut Machtens die besseren Erfolgsaussichten als eine sekundäre Hormontherapie.

Auch für Patienten mit weniger aggressiver Erkrankung ist Cabazitaxel nach Docetaxel eine valide Therapieoption und dem Wechsel auf Abirateron gleichzustellen. Machtens wies darauf hin, dass Cabazitaxel in der Zulassungsstudie TROPIC das relative Sterberisiko der Patienten um 30 % gegenüber der Behandlung mit Mitoxantron reduzierte (HR 0,70; $p < 0,0001$) [de Bono JS et al. Lancet. 2010;376(9747):1147–54]. Addiert man die medianen Überlebenszeiten aus der TAX327-Studie, der Zulassungsstudie von Docetaxel, und der TROPIC-Studie, hätten die Patienten unter der Chemotherapie-Sequenz Docetaxel gefolgt von Cabazitaxel die Chance, im Median fast 30 Monate zu überleben [Sartor et al. ASCO 2011; Abstr. 4525]. *Birgit-Kristin Pohlmann*

Satellitensymposium „Das metastasierte Prostatakarzinom – neue Therapieoptionen und ihre Chancen für den Patienten“ im Rahmen des DGU-Kongresses, Leipzig, 27.09.2012; Veranstalter: Sanofi-Aventis