Umfrage zeigt Defizite bei der Tumorschmerztherapie

— Obschon spezifische Opioidanalgetika mit einer an das Zeitprofil der tumorbedingten Durchbruchschmerzen (DBS) angepassten Pharmakokinetik zur Verfügung stehen, sei das DBS-Management in Deutschland nach wie vor lückenhaft, so Johannes Horlemann, Kevelaer. Eine Umfrage bei 95 überwiegend allgemeinmedizinischen Arztpraxen mit insgesamt 1.750 Tumorpatienten hat gezeigt, dass in Bezug auf Diagnose und Therapie von DBS offensichtlich noch Versorgungsdefizite in Deutschland bestehen. In der Mehrzahl der befragten Arztpraxen werden nicht retardierte Opioidanalgetika als Bedarfsmedikation bei tumorbedingten DBS verordnet. Diese fluten aber zu langsam an und können DBS-Episoden nicht adäquat kontrollieren, so Horlemann. Die neue Praxisleitlinie Tumorschmerz der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie e. V. (DGS) weist explizit darauf hin, dass schnell anflutendes Fenta-

nyl als Bedarfsmedikation bei DBS-Episoden anderen Opioidanalgetika in Wirksamkeit und Verträglichkeit überlegen ist. Die Ergebnisse einer europäischen Phase-IV-Studie bestätigen die hohe Effektivität von Fentanyl Buccaltablets (FBT, Effentora®) in der routinemäßigen Anwendung bei tumorbedingten DBS. Eberhard Lux, Lünen, präsentierte die aktuellen Interimsdaten der 90 Studienteilnehmer aus Deutschland. Bei den meisten Patienten führte eine FBT-Dosis von 100 µg (25 % der Patienten) und 200 µg (42 % der Patienten) zu einer guten Kontrolle der DBS-Attacken. Nach der Titration auf eine wirksame Dosis waren 73,8 % der Patienten zufrieden mit Fentanyl-Buccaltablets als Bedarfsmedikation. *Abdol Ameri*

Satellitensymposium „Best-practice vs. In-practice: Tumordurchbruchschmerzen – medizinischer Kenntnisstand und Versorgungsrealität“ im Rahmen des Deutschen Schmerzkongresses, Mannheim, 18.10.2012; Veranstalter: TEVA

First-Line-Therapie mit Bendamustin bei fortgeschrittener CLL

— Patienten mit fortgeschrittener chronischer lymphatischer Leukämie (CLL), die mit einer kompletten Remission auf die Therapie ansprechen, leben länger. Wird Bendamustin (Levact®) als First-Line-Therapie eingesetzt, ist die Chance auf eine komplette Remission größer als unter Chlorambucil. Diese Erkenntnisse aus neueren Studien werden durch die Langzeitergebnisse einer randomisierten, offenen Phase-III-Studie bestätigt [Knauf WU et al. Br J Haematol. 2012;159(1):67-77]. In der Studie wurde Bendamustin mit Chlorambucil bei unvorbehandelten CLL-Patienten in den fortgeschrittenen Krankheitsstadien Binet B oder C verglichen. Bendamustin war mit einer Gesamtansprechrate (ORR) von 68 % signifikant wirksamer ($p < 0,0001$) als die Vergleichssubstanz mit nur 31 % Ansprechen [Knauf WU et al. J Clin Oncol. 2009;27(26):4378-84], die Rate an kompletten Remissionen (CR) im Bendamustin-Arm war signifikant höher (31 vs. 2 %). Das progressionsfreie Überleben (PFS) mit 21,2 vs. 8,8 Mona-

ten ($p < 0,0001$) und die Zeit bis zur nächsten Therapie (TTNT) waren unter Bendamustin ebenfalls signifikant länger. Von den in die erste Intent-to-Treat-Analyse eingeschlossenen 319 Patienten waren nach 54 Monaten Follow-up 244 Patienten auswertbar (Bendamustin: $n = 129$, Chlorambucil: $n = 115$). Diese Analyse bestätigte die bereits in der Erstpublikation gezeigten Vorteile für Bendamustin als First-Line-Therapie bei allen signifikanten Endpunkten (ORR, CR, PFS, TTNT). 31 % der Patienten sprachen in der First-Line vollständig (CR) auf die Behandlung mit Bendamustin an, während es im Vergleichsarm mit Chlorambucil nur 2 % waren. Patienten, die insgesamt auf die Therapie ansprachen, lebten länger als Non-Responder (not reached vs. 68,3 Monate). Diejenigen Patienten, die durch die Therapie eine CR erzielten, lebten länger als alle anderen Patienten (not reached vs. 75,9 Monate). *red*

Nach Informationen von Mundipharma

Schilddrüsenkrebs: Zulassung für Sorafenib beantragt

In der klinischen Phase-III-Studie DECISION mit Sorafenib (Nexavar®) wurde eine statistisch signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens erreicht. Die Studie untersuchte Sorafenib als Monotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem differenziertem Schilddrüsenkrebs, die auf eine Radiojod-Behandlung nicht mehr ansprachen (Radiojod-refraktär). Die erhobenen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit entsprachen dem bekannten Sicherheitsprofil von Sorafenib. Die detaillierten Ergebnisse der Studie werden auf einem der nächsten wissenschaftlichen Kongresse präsentiert. *red*

Nach Informationen von Bayer Pharma

Pomalidomid: Überlebensvorteil beim multiplen Myelom

Stark vorbehandelte Patienten mit rezidiertem oder refraktärem multiplen Myelom (rrMM) haben durch eine Behandlung mit Pomalidomid in Kombination mit niedrigdosiertem Dexamethason einen signifikanten Überlebensvorteil gegenüber Patienten, die eine Monotherapie mit hochdosiertem Dexamethason erhalten haben [Dimopoulos MA et al. ASH Annual Meeting 2012. Abstract LBA-6].

Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 455 Patienten behandelt, deren Erkrankung refraktär auf Bortezomib und Lenalidomid war. Im Verhältnis 2:1 randomisiert erhielten sie entweder Pomalidomid (POM) in Kombination mit Dexamethason (LoDEX) oder hochdosiertem Dexamethason (HiDEX) mono. Das progressionsfreie Überleben in der POM+LoDEX-Gruppe war nach einem medianen Follow-up von 18 Wochen mit durchschnittlich 3,6 Monaten doppelt so lang wie in der HiDEX-Gruppe (1,8 Monate; HR 0,45; $p < 0,001$). In der Pomalidomid-Gruppe traten Neutropenien und febrile Neutropenien häufiger auf als im Vergleichsarm. Dagegen war die Rate an Thrombozytopenien, Infektionen sowie venösen Thromboembolien in beiden Gruppen vergleichbar.

Aus den vorliegenden Daten folgern die Autoren, dass Pomalidomid in Kombination mit LoDEX der neue Therapiestandard für Bortezomib- und Lenalidomid-refraktäre Patienten werden sollte. *red*

Nach Informationen von Celgene