ALL bei Erwachsenen – bessere Chancen durch liposomales Vincristin?

Die Prognose der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) bei Erwachsenen ist schlecht. In einer internationalen Phase-II-Studie, die als Zulassungsstudie geplant war, wurde die Effektivität von liposomalem Vincristin bei rezidivierender oder therapierefraktärer Erkrankung geprüft.

In die Studie wurden 65 erwachsene Patienten mit bestätigter Philadelphia-Chromosom-negativer ALL aufgenommen. Bei allen lag mindestens das zweite Rezidiv oder eine Progression nach mindestens zwei Chemotherapien vor.

In wöchentlichen Abständen erhielten die Patienten 2,25 mg/m² Vincristinsulfat in einer liposomalen Galenik ohne weitere Anpassung bzw. Reduktion der Dosis (ohne „Dose Capping“). Hydroxy-

harnstoff und Steroide zur Kontrolle der Leukozytose waren im Studienprotokoll zugelassen. Die Behandlung erfolgte bis zum Ansprechen, einer weiteren Krankheitsprogression, dem Abbruch wegen Toxizität oder der Entscheidung zu anderen Behandlungen wie einer Stammzelltransplantation.

Die Teilnehmer erhielten im Median vier Vincristin-Dosierungen, die 30-Tages-Mortalität lag bei 12 %. Bei 11 % der

Patienten trat eine komplette Remission ein, bei weiteren 9 % eine komplette Remission mit unvollständiger hämatologischer Erholung (Tab. 1). Weitere 15 % erreichten eine partielle Remission oder ein Ansprechen in Bezug auf den Blastenanteil im Knochenmark.

Die mediane Dauer der Komplettremissionen (inklusive unvollständiger hämatologischer Erholung) betrug 23 Wochen. Zwölf Patienten konnten eine Stammzelltransplantation erhalten. Das mediane Gesamtüberleben aller Teilnehmer lag bei 4,6 Monaten, das der Patienten mit kompletter Remission bei 7,7 Monaten. Fünf Patienten überlebten länger als ein Jahr. Bei 23 % trat eine periphere Neuropathie vom Grad 3 auf; in einem Fall wurde eine Grad-4-Reaktion beobachtet.

Fazit: Die Autoren weisen auf die hohe verabreichte Dosis hin, die mit konventionellem Vincristin üblicherweise nicht erreicht wird, sowie auf die trotzdem relativ niedrigen Mortalitätszahlen im ersten Monat. Ob die neue Galenik das Langzeitüberleben der Patienten tatsächlich verbessert, wird sich in größeren Studien zeigen. *Andreas Fischer*

Primäre, sekundäre und wichtige Subgruppen-Wirksamkeits-Ergebnisse (Intention-to-treat-Population n = 65)

Tabelle 1

Ergebnis	Anzahl der Patienten (95 %-KI)	%
CR gesamt	13 (11,1–31,8)	20
CR	7 (4,4–20,9)	11
CRi	6 (3,5–19,0)	9
PR	6 (3,5–19,0)	9
BMB	4 (1,7–15,0)	6
Gesamtansprechen (CR, CRi, PR, BMB)	23 (23,8–48,3)	35

95 %-KI = 95 %-Konfidenzintervall; CR = komplettes Ansprechen; CRi = CR mit incompletter hämatologischer Erholung; PR = partielles Ansprechen; BMB = Ansprechen der Knochenmarksblasten

O'Brien S et al. High-dose vincristine sulfate liposome injection for advanced, relapsed or refractory adult Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol.* 2013;31(6):676-83.

Bortezomib beim follikulären Lymphom: Ein- oder zweiwöchentlich geben?

Der Proteasominhibitor Bortezomib ist aktiv bei indolenten Lymphomen. In einer Phase-II-Studie wurde nach der optimalen Dosierung geforscht.

Das follikuläre Lymphom (FL) als das häufigste indolente Non-Hodgkin-Lymphom gilt generell als unheilbar. Die Einführung neuer zielgerichteter Therapien führte jedoch zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtüberlebens, das heute bei median 15 Jahren liegt. Der klinische Verlauf ist von wiederholten Rezidiven geprägt, die in 50–60 % der

Fälle in aggressive Lymphome übergehen.

Zur Monotherapie des FL mit dem Proteasominhibitor Bortezomib kamen bisher verschiedene Dosierschemata zum Einsatz. Jetzt liegen die Ergebnisse einer offenen, randomisierten und multizentrischen Phase-II-Studie vor, die Wirksamkeit und Verträglichkeit eines wöchentlichen und zweiwöchentlichen Behandlungsschemas bei 87 mehrfach vorbehandelten Patienten mit rezidiviertem oder therapierefraktärem FL verglich. Arm A erhielt 1,5 mg/m² Bortezomib an den Tagen 1, 4, 8 und 11 in einem 21-tägigen Zyklus, Arm B wöchentlich

1,6 mg/m² an den Tagen 1, 8, 15 und 22 über 35 Tage. 30 % der Patienten in Arm A erreichten ein Ansprechen gegenüber 22 % in Arm B. Die mediane Ansprechdauer lag bei 16 bzw. 15 Monaten für die beiden Studienarme bei meist leichten therapiebedingten Nebenwirkungen.

Fazit: Die Therapie des FL im Rahmen eines zweimal wöchentlichen Schemas ist gut verträglich und wirksam. Trotz höherer Ansprechraten gegenüber dem Wochenmodus ergab die Endauswertung keine klinisch relevanten Unterschiede. *Wolfgang Zimmermann*

Ribrig V et al. Efficacy and toxicity of two schedules of bortezomib in patients with recurrent or refractory lymphoma: A randomised phase II trial from the Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA). *Eur J Cancer.* 2013;49(4):904-10.