Grünes Licht für neue Option bei mCRPC

— Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hat die Zulassung von Enzalutamid zur Behandlung von erwachsenen Männern mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), deren Erkrankung während oder nach Docetaxel-Therapie fortschreitet, empfohlen.

Enzalutamid ist ein neuer Androgenrezeptor-Signalinhibitor zur einmal täglichen oralen Einnahme, der mehrere Schritte des Androgenrezeptor-Signalwegs hemmt. Es kommt zu einer Wachstumsreduktion der Karzinomzellen und zu einer Apoptoseinduktion [Scher HI et al. Lancet. 2010;375(9724):1437-46].

Das positive CHMP-Votum basiert auf den Ergebnissen einer Phase-III-Zulassungsstudie. Danach führt Enzalutamid im Vergleich zu Placebo zu einer statistisch signifikanten Verlängerung des Gesamtüberlebens

(18,4 vs. 13,6 Monate; Hazard Ratio [HR] 0,63; $p < 0,0001$) – ein Überlebensvorteil von 4,8 Monaten. Die Studie zeigte außerdem, dass Enzalutamid von den Patienten allgemein gut vertragen wurde und alle sekundären Endpunkte erreicht hat [Scher HI et al. ASCO-GU 2012, Oral Presentation 2. Februar 2012].

Die Zulassungsempfehlung des CHMP wird von der Europäischen Kommission, die die Befugnis zur Zulassung von Arzneimitteln in der europäischen Union hat, überprüft. Üblicherweise ergeht der Bescheid der Europäischen Kommission innerhalb von 60 Tagen nach einer positiven CHMP-Empfehlung. Daher erwartet das herstellende Unternehmen die endgültige Entscheidung über die Zulassung in Europa in Kürze. *red.*

Nach Informationen von Astellas Pharma

Akutschmerzdienst: bessere Versorgung, weniger Kosten

— Über 80 % der stationären Patienten in Deutschland leiden unnötig Schmerzen, 55 % bewerten ihre Schmerzen als nicht akzeptabel [Maier C et al. Dtsch Arztebl. 2010;107(36):607-14]. Der Einsatz eines Akutschmerzdienstes kann die schmerztherapeutische Versorgung optimieren. „Entscheidend ist, die Schmerzmessung nach festen Regeln einzuführen und alle Berufsgruppen und Disziplinen auf vorhandene Standards einzuschwören“, betonte Christian Schmidt, Köln, im Rahmen des Deutschen Anästhesiekongresses in Nürnberg. Implementierte Schmerzstandards regeln die komplexe schmerztherapeutische Versorgung durch Ärzte und Pflegende.

Wichtig ist die Definition einer Standardtherapie basierend auf einer Basisanalgesie in retardierter Form und einer Bedarfsmedikation in unretardierter Form. „Bewährt hat sich in unserem Zentrum der Einsatz von Targin® als Basismedikation sowie schnell freisetzendes Oxycodon, wie z. B. Oxygesic® akut, Oxygesic® injekt oder Oxygesic® dispersa als Bedarfsmedikation“, berichtete José Hinz aus Göttingen. Mit der Fixkombination aus retardiertem Oxycodon und re-

tardiertem Naloxon zur Basistherapie sei eine starke Wirksamkeit bei guter Verträglichkeit gewährleistet.

Eine suffiziente Schmerztherapie in der perioperativen Phase trägt auch dazu bei, die Inzidenz perioperativer Komplikationen zu senken und die Rekonvaleszenz der Patienten zu beschleunigen. „Das steigert die Zufriedenheit und minimiert indirekt Kosten“, erläuterte Martin Bauer, Göttingen. Eine prospektive Studie ergab eine Einsparung von 90.000 Euro pro Jahr durch den Einsatz eines Akutschmerzdienstes [Brodner G et al. Eur J Anaesthesiol. 2000;17(9):566-75]. Daher ist ein Akutschmerzdienst laut Bauer ein relevanter Erfolgsfaktor für Behandlungsqualität, Rentabilität und Außenwirkung eines Krankenhauses.

Eine Broschüre zum Akutschmerzdienst im Spannungsfeld zwischen Patientenkomfort, Anforderungen an das Personal und Wirtschaftlichkeit („Akutschmerzdienst – ein Erfolgsmodell?“) ist kostenfrei anzufordern unter Fax-Nr. 06431/701 433 oder per E-Mail: medinfo@mundipharma.de. *red.*

Nach Informationen von Mundipharma

Mehr Packungsgrößen unter Festbetrag

Temozolomid ist angezeigt zur Behandlung von erstmalig diagnostiziertem Glioblastoma multiforme begleitend zur Radiotherapie und anschließend als Monotherapie. Zudem wird es bei Kindern ab 3 Jahren und Jugendlichen bei einem nach Standardtherapie rezidivierenden oder progredienten malignen Gliom eingesetzt. Temozolomid HEXAL® ist indikationsgleich und bioäquivalent zum Erstanbieter Temodal®. Temozolomid HEXAL® Hartkapseln stehen ab sofort in vier zusätzlichen Packungsgrößen zur Verfügung: 5 Kapseln (N1) in den Wirkstärken 5 mg und 20 mg sowie 20 Kapseln (N2) in den Stärken 140 mg und 180 mg. Die zusätzlichen Packungsgrößen ermöglichen eine flexible Anpassung des Kapselbedarfs an die individuelle Therapie und erhöhen damit die Wirtschaftlichkeit: Bei der dosisintensivierten Temozolomid-Therapie können sie die Zuzahlungen reduzieren, weil das Präparat weniger oft verordnet werden muss. Der Preisvorteil im Vergleich zum Festbetrag beträgt bis zu 26 %. *red.*

Nach Informationen von HEXAL

Schwierige Therapie bei Meningeosis neoplastica

Besteht der Verdacht auf eine Meningeosis neoplastica (MN), sind eine frühzeitige Differenzialdiagnostik und eine unverzüglich einsetzende Therapie unerlässlich, betonte Karin Jordan vom Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie präsentierte eigene Daten zur Behandlung dieses problematischen Patientenkreises mit intrathekal verabreichtem liposomalem Cytarabin (DepoCyt®). Nach den Ergebnissen der retrospektiven Effektivitätsanalyse von 48 behandelten Patienten verbesserte das intrathekal applizierte Depot-Präparat bei über der Hälfte der Behandelten die neurologische Symptomatik, 53 % der Patienten zeigten auch ein zytologisches Ansprechen. Von Vorteil bei dieser Therapie ist laut Jordan einerseits die einmalige intrathekale Gabe und andererseits die Kombinationsmöglichkeit mit einer systemischen Chemotherapie oder einer Ganzhirnbestrahlung. *Wolfgang Zimmermann*

23. Münchener Fachpresseworkshop „Onkologie“, 13. Mai 2013, München; Veranstalter: Mundipharma