Pembrolizumab bei Nasopharynxkarzinom

Der PD1-Inhibitor Pembrolizumab (Keytruda®) ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der durch die Blockade der Bindung zwischen PD1 und seine Liganden PD-L1 und PD-L2 die körpereigene Antitumorantwort reaktiviert. Der Wirkstoff ist bereits zugelassen zur Monotherapie des fortgeschrittenen malignen Melanoms. Die Studie KEYNOTE-028 ist eine laufende, nicht randomisierte Phase-Ib-Studie, in der als Kohortenvergleichsstudie die Wirksamkeit und Sicherheit von Pembrolizumab bei 450 Patienten mit 20 unterschiedlichen fortgeschrittenen soliden Tumoren getestet wird. Die Tumoren exprimieren alle den Liganden PD-L1 und sprachen auf bisherige Therapien nicht an bzw. bisherige Therapien waren für die Patienten ungeeignet.

Nun wurden erstmals Daten aus der Studie KEYNOTE-028 zum fortgeschrittenen, nicht resezierbaren Nasopharynxkarzinom [Chiu H et al. ECC. 2015; Abstr 2801] sowie zum fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinom

des Analkanals [Ott P et al. ECC. 2015; Abstr 500] und zum Gallengangskarzinom [Bang YJ et al. ECC. 2015; Abstr 525] vorgestellt. Die Gesamtansprechraten betrugen bei den stark vorbehandelten Patienten mit Nasopharynxkarzinom (n = 27) 22 %, mit Analkarzinom (n = 25) 20 % und mit Gallengangskarzinom (n = 24) 17,4 %.

Insbesondere die Patienten mit Nasopharynxkarzinom profitierten von der Immuntherapie mit Pembrolizumab. Sechs Patienten sprachen partiell an, bei 5,6 % der Patienten stabilisierte sich die Erkrankung, die Krankheitskontrollrate betrug 77,8 % und 67,0 % der Patienten sprachen sogar mit einer Reduktion der Tumorgröße an. Das progressionsfreie Überleben betrug nach sechs Monaten 49,7 % und nach einem Jahr 28,9 %.

Andrea Warpakowski

„MSD Media Briefing European Cancer Congress (ECC)“, Wien, 28. September 2015; Veranstalter MSD (Merck Sharp & Dohme)

Ist eine begleitende Harnsäuresenkung sinnvoll?

17,5 % der Krebspatienten entwickelten in einer Studie in einem Jahr eine akute Nierenschädigung (AKI). In einer Studie mit 200 intensivmedizinisch behandelten Patienten mit neu diagnostizierten hämatologischen Malignomen erlitten 68,5 % eine AKI. Patienten mit AKI erreichten seltener eine komplette Remission nach sechs Monaten (39,4 vs. 68,3 % p < 0,01) und hatten eine höhere Mortalität (47,4 vs. 30,2 %; p < 0,01). Dramatisch ist die Situation bei Patienten mit hämatologischen Tumoren und dialysepflichtiger AKI, bei denen das mediane Überleben in einer Studie 33 Tage und die Mortalität 60 % betrug.

Nach Einschätzung von Jan Kielstein, Braunschweig, ist in der Regel eine Kombination nephrotoxischer Faktoren für eine Dialysepflicht verantwortlich. Ein wichtiger Faktor ist die Hyperurikämie. Allopurinol stabilisierte die Nierenfunktion von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und Hyperurikämie, während sich die glomeruläre Filtrationsrate unter Placebo weiter verschlechterte.

Als wirksamer als Allopurinol erwies sich Febuxostat (Adenuric®). In einer Studie mit herzchirurgischen Patienten halbierte Febuxostat die Albumin-Ausscheidung im Urin im Verlauf von sechs Monaten, während in der Allopurinol-Gruppe eine Zunahme eintrat. Laut einer Metaanalyse erreichten Hyperurikämie-Patienten mit Febuxostat signifikant häufiger einen Zielspiegel < 6 mg/dl als mit Allopurinol (p < 0,01) [Ye P et al. Clin Ther. 2013;35(2):180-9].

Eine überlegene Wirksamkeit zeigte sich zudem in der Zulassungsstudie für Febuxostat zur Prophylaxe des Tumorlysesyndroms, in der Febuxostat bereits nach 24 Stunden und von da an an jedem weiteren Tag der Beobachtung mit einem signifikant niedrigeren Harnsäurespiegel als Allopurinol assoziiert war [Spina M et al. Ann Oncol. 2015; 26(10):2155-61].

Günter Springer

Satellitensymposium „Tumorlysesyndrom und HON Circle – neue therapeutische Möglichkeiten“, DGHO-Jahrestagung, Basel, Schweiz, 9. Oktober 2015; Veranstalter: Berlin-Chemie

Pankreaskarzinom: Länger und besser Leben durch Kombitherapie

Bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom verlängert eine Behandlung mit nab-Paclitaxel (Abraxane®) plus Gemcitabin bis zum Progress das Gesamtüberleben im Vergleich zu Patienten, die wegen unerwünschter Ereignisse die Therapie abbrechen. Außerdem kann der Karnofsky-Performanceindex unter der Kombination besser erhalten werden als mit Gemcitabin allein. Dies haben zwei Post-hoc-Analysen der Zulassungsstudie MPACT gezeigt [Vogel A et al. ECC. 2015; Poster 2358; Chiorean EG et al. ECC. 2015; Poster 2346]. Bereits vorher konnte in MPACT belegt werden, dass die nab-Paclitaxel/Gemcitabin in allen Endpunkten der Gemcitabin-Monotherapie überlegen ist. In einer retrospektiven Analyse wurde nun bestätigt, dass die Kombination als Therapiestandard beim metastasierten Pankreaskarzinom in der klinischen Praxis genauso gut funktioniert wie unter Studienbedingungen [Giordano G et al. ECC. 2015; Poster 2334 und 2335].

red.

Nach Informationen von Celgene

Online-Informationen zu neuroendokrinen Tumoren

Für die Behandlung von gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren (GEP-NET) mit Ursprung im Mitteldarm, Pankreas oder unbekannter Primärlokalisation (Enddarm ausgeschlossen) bei Erwachsenen mit inoperabler, lokal fortgeschrittener oder metastasierter Erkrankung ist seit März 2015 das Somatostatinanalogon Somatuline Autogel® zugelassen. Das Präparat reduzierte in der CLARINET-Studie das Risiko für eine Tumorprogression oder Tod signifikant um 53 % im Vergleich zu Placebo (Hazard Ratio 0,47) [Caplin ME et al. N Engl J Med. 2014;371(3):224-33]. Diese klinisch signifikanten Antitumoreffekte wurden in einer großen Gruppe von Patienten mit GEP-NET vom Grad G1 oder niedrigem G2 beobachtet (Ki-67 < 10 %). Informationen zur Therapie und Diagnostik von GEP-NET stehen nun unter www.clarinet-studie.de zur Verfügung. Die Website enthält wichtige Daten zur CLARINET-Studie, internationale Leitlinien und Therapiealgorithmen sowie zahlreiche Services und Materialien zum Herunterladen.

red.

Nach Informationen von Ipsen