Zielgerichtete Kombination bei metastasiertem Melanom mit BRAF-Mutation

— In den Phase-III-Studien COMBI-d und COMBI-v wurde die Wirksamkeit der oral applizierten Kombinationstherapie aus dem BRAF-Inhibitor Dabrafenib (Tafinlar®) und dem MEK-Inhibitor Trametinib (Mekinist®), die den MAP-Kinase-Signalweg an zwei Stellen blockieren, bei Patienten mit nicht resezierbarem oder metastasiertem Melanom mit BRAF-V600-Mutation untersucht [Long GV et al. Lancet. 2015;386(9992): 444-51; Robert C et al. N Engl J Med. 2015; 372(1):30-9].

Die Patienten wurden in der COMBI-d-Studie mit der Kombination aus Dabrafenib (150 mg 2-mal täglich) plus Trametinib (2 mg 1-mal täglich) oder nur mit Dabrafenib (150 mg 2-mal täglich) behandelt. In der COMBI-v-Studie erhielten Patienten dieselbe Kombinationstherapie oder Vemurafenib (960 mg 2-mal täglich).

Sowohl in der COMBI-d- als auch in der COMBI-v-Studie war das progressionsfreie

Überleben im Median unter der Kombinationstherapie signifikant länger (COMBI-d-Studie: 11,0 vs. 8,8 Monate; Hazard Ratio [HR] 0,67; $p = 0,0004$; COMBI-v-Studie: 11,4 vs. 7,3 Monate; HR 0,56; $p < 0,001$).

In beiden Studien überlebten die Patienten unter dem Kombinationsregime im Median deutlich länger als unter der jeweiligen BRAF-Inhibitor-Monotherapie. Die 2-Jahres-Überlebensrate lag in der COMBI-d-Studie lag unter der Kombination bei 51 % (vs. 42 %; HR 0,71; $p = 0,011$).

Wie die Ergebnisse der COMBI-d-Studie zeigen, wurde unter der zielgerichteten Kombinationstherapie auch eine verbesserte Lebensqualität bei den Patienten beobachtet.

Ulrike Hafner

Pressekonferenz „Innovation durch Kombination – die zielgerichtete Therapie des BRAF-positiven metastasierten Melanoms mit Tafinlar® und Mekinist®“, Frankfurt/Main, 22. September 2015; Veranstalter: Novartis Pharma

Nivolumab erhält FDA-Zulassung bei fortgeschrittenem RCC

Die FDA hat im November 2015 den Checkpointinhibitor Nivolumab (Opdivo®) zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom (RCC) und vorhergehender antiangiogener Therapie zugelassen. Grundlage hierfür waren die Ergebnisse der offenen Phase-III-Studie CheckMate-025, in der Patienten unter Nivolumab ein medianes Gesamtüberleben von 25 Monaten im Vergleich zu 19,6 Monaten unter Everolimus, der bisherigen Standardtherapie für diese Patienten, erreichten (Hazard Ratio 0,73; $p = 0,0018$). Nivolumab ist der erste Checkpointinhibitor, für den ein signifikanter Überlebensvorteil in dieser Patientengruppe nachgewiesen werden konnte. Der beobachtete Überlebensvorteil war unabhängig von der PD-L1-Expression. Darüber hinaus zeigten sich eine überlegene Gesamtansprechrate unter Nivolumab im Vergleich zu Everolimus (21,5 vs. 3,9 %) und eine längere mediane Ansprechdauer (23,0 vs. 13,7 Monate).

red.

Nach Information von Bristol-Myers Squibb

Kombination mit nanoliposomalem Irinotecan punktet bei metastasiertem Pankreaskarzinom

— Die Kombination von nanoliposomalem Irinotecan (nal-IRI) plus 5-Fluorouracil/Folsäure (5-FU/LV) hat in einer Phase-II-Studie bei Patienten mit Gemcitabin-refraktärem, metastasiertem Pankreaskarzinom einen Überlebensvorteil gezeigt.

In der dreiarmligen, randomisierten Phase-III-Studie NAPOLI-1 erhielten 417 Patienten mit metastasiertem, Gemcitabin-refraktärem Pankreaskarzinom entweder eine Monotherapie mit der nanoliposomalen Formulierung des Topoisomerase-Hemmers Irinotecan oder eine Monotherapie mit 5-FU/LV oder die Kombination aus nal-IRI und 5-FU/LV [Von Hoff D et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl 2):105-6; Von Hoff D et al. ASCO GI. 2015;Abstr 234]. Die Studie wurde erst nach dem Vorliegen der Sicherheitsdaten um den Kombinationsarm erweitert. Primärer Studienendpunkt war das Gesamtüberleben, zu den sekundären Endpunkten zählten progressionsfreies Überleben, Remissionsrate und Gesamtansprechrate.

Die Gesamtüberlebenszeit war bei den mit nal-IRI plus 5-FU/LV behandelten Patienten signifikant länger als bei den Patienten mit 5-FU/LV-Monotherapie (ITT-Population: 6,1 vs. 4,2 Monate; Hazard Ratio [HR] 0,57; $p = 0,0009$). Auch das progressionsfreie Überleben war unter der Kombinationstherapie signifikant länger (3,1 vs. 1,5 Monate; HR 0,56; $p = 0,0001$). Mit der nal-IRI-Monotherapie konnte hingegen kein signifikanter Überlebensvorteil gegenüber der 5-FU/LV-Monotherapie verzeichnet werden. Zu den Nebenwirkungen $\geq$ Grad 3 zählten Fatigue, Diarrhö, Erbrechen und Übelkeit.

In den USA ist nal-IRI zur Therapie des fortgeschrittenen, gegen Gemcitabin refraktären Pankreaskarzinoms in Kombination mit 5-FU/LV schon zugelassen. Für Europa wurde die Zulassung beantragt.

Ursula Hilpert

Satellitensymposium „Neue Optionen in der Therapie des Pankreaskarzinoms und der Myelofibrose“ anlässlich der DGHO-Jahrestagung, Basel, Schweiz, 9. Oktober 2015; Veranstalter: Baxalta

Neue Website informiert über Lungenkrebs

Eine zentrale Anlaufstelle zu allen Fragen rund um das Lungenkarzinom bietet die Website www.lungenkrebs-verstehen.de. Dieses Angebot richtet sich sowohl an Ärzte als auch an Betroffene, Angehörige und andere Interessierte. Zu finden sind dort detaillierte Informationen zum Lungenkarzinom, zur Diagnostik und Mutationsanalyse sowie zu aktuellen Therapiekonzepten. Sie bietet auch einen Überblick zu Nachsorgeuntersuchungen und weiterführende Informationen zu aktuellen klinischen Studien.

Als weiteres Serviceangebot stehen Informationsbroschüren zum kostenlosen Download sowie Videos zur Verfügung. Damit will Novartis sein Engagement bei dieser malignen Tumorerkrankung ausweiten. Der Tyrosinkinaseinhibitor Ceritinib (Zykadia®) ist für erwachsene Patienten mit fortgeschrittenem, ALK(„anaplastic lymphoma kinase“)-positivem, nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und Crizotinib-Vorbehandlung eine wichtige neue Behandlungsoption. Die Zulassung erfolgte im Mai 2015.

red.

Nach Information von Novartis Pharma