Zwei weitere Indikationen für Ramucirumab

— Der monoklonale Antikörper Ramucirumab (Cyramza®) wurde im Januar 2016 in zwei weiteren Indikationen zugelassen. Das Medikament kann nun auch bei vorbehandelten Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) in Kombination mit Docetaxel eingesetzt werden, und darüber hinaus in Kombination mit FOLFIRI zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom (mCRC), deren Erkrankung progredient geworden ist. Die Zulassungen basieren auf den Daten der randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Phase-III-Studien REVEL und RAISE.

In REVEL wurde die Kombination aus Ramucirumab plus Docetaxel im Vergleich zu Docetaxel plus Placebo bei Patienten mit metastasiertem NSCLC geprüft, deren Erkrankung während oder nach einer vorherigen platinbasierten Erstlinienchemotherapie fortgeschritten war [Garon EB et al.

Lancet. 2014;384(9944):665-73]. In die Studie waren sowohl Patienten mit plattenepithelialer als auch Patienten mit nicht plattenepithelialer Tumorhistologie eingeschlossen.

In der RAISE-Studie erhielten Patienten mit mCRC, deren Erkrankung während oder nach einer Erstlinientherapie mit Bevacizumab, Oxaliplatin und einem Fluoropyrimidin progredient geworden war, im Verhältnis 1:1 randomisiert entweder Ramucirumab plus FOLFIRI oder Placebo plus FOLFIRI [Tabernero J et al. Lancet Oncol. 2015;16(5):499-508]. Primärer Endpunkt beider Phase-III-Zulassungsstudien war das Gesamtüberleben.

Bereits seit 2014 ist der Antikörper für die Zweitlinientherapie des fortgeschrittenen oder metastasierten Adenokarzinoms des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs zugelassen. *red.*

Nach Information von Lilly

MDS: Eisenüberladung verkürzt das Leben

— Eine Eisenüberladung ist eine potenziell lebensgefährliche Folge wiederholter Transfusionen. Zwischen 50 und 60 % der Betroffenen haben eine schwere Anämie, bis zu 90 % sind auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen. Bereits nach einer Gabe von 20 Erythrozytenkonzentraten kann es zu einer Überladung mit Eisen kommen.

Dass eine Eisenüberladung vor und während einer Stammzelltransplantation bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom (MDS) mit einer erhöhten Mortalität assoziiert ist, zeigten nun die Ergebnisse der ALLIVE-Studie [Wermke M et al. ASH. 2015; Abstr 386]. Patienten mit labilem Plasmaeisen > 0,4 µmol/l wiesen an Tag 100 eine signifikant erhöhte nicht rezidivbedingte Mortalität auf (34,6 vs. 6%; $p < 0,001$; $n = 109$). Gesamteisenkonzentrationen der Leber > 125 µmol/g an Tag 100 waren ebenfalls mit einer signifikant erhöhten rezidivunabhängigen Mortalitätsrate assoziiert (19,8 vs. 6,8%; $p = 0,034$; $n = 111$). Hielt eine Eisenüberladung 14 Tage nach der Stamm-

zelltransplantation an, sank die Überlebensrate deutlich (19 vs. 4,9%; $p = 0,025$; $n = 109$). Eine effektive Eisenchelation ist für diese Patientengruppe somit von entscheidender Bedeutung.

In der MDS-CAN-Studie wurde auf Basis der Daten des kanadischen MDS-Registers untersucht, inwieweit eine Eisenchelation das Gesamtüberleben transfusionsabhängiger MDS-Patienten mit geringer oder intermediärer Risikoklasse beeinflusst [Parmar A et al. ASH. 2015; Abstr 1701]. Eingeschlossen waren 219 Patienten. 70 Teilnehmer (32 %) erhielten eine Therapie mit Eisenchelatoren, davon 56 mit Deferasirox (Exjade®). Patienten unter Chelattherapie wiesen gegenüber unchelierten Patienten ein signifikant längeres medianes Gesamtüberleben auf (8,62 vs. 4,38 Jahre; $p = 0,0005$). Die Ergebnisse von MDS-CAN bestätigen frühere Langzeitstudien, die einen günstigen Einfluss von Eisenchelatoren auf das Überleben von MDS-Patienten nahelegten. *red.*

Nach Information von Novartis Pharma

Studiendaten zu Daratumumab bei multiplem Myelom

Neue Phase-I/II-Daten zu dem gegen CD38 gerichteten Antikörper Daratumumab bei rezidiertem und/oder refraktärem multiplem Myelom zeigen eine Gesamtansprechrate in beiden Studien zusammengefasst von 31 %, wobei 10 % der Patienten sehr gut auf die Monotherapie ansprachen (VGPR), zwei Patienten ein komplettes Ansprechen (CR) und drei Patienten ein stringentes komplettes Ansprechen (sCR) erreichten. Nach einer medianen Beobachtungsdauer von 9,3 Monaten betrug die 1-Jahres-Gesamtüberlebensrate 69 %. *red.*

Nach Information von Janssen-Cilag

Neues Bendamustin-Generikum

Das Zytostatikum Bendamustin ist ab sofort auch als Generikum von medac erhältlich. Das Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats wird in zwei Wirkstärken (25 mg und 100 mg) angeboten. Zugelassen ist das Chemotherapeutikum als Erstlinientherapie bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL), als Monotherapie bei Patienten mit indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen sowie als Primärtherapie für das multiple Myelom in Kombination mit Prednison. Da etwa 20 % der verabreichten Dosis innerhalb von 24 Stunden im Urin wiedergefunden werden, kann Bendamustin medac auch unabhängig von der Nierenfunktion dosiert werden. *red.*

Nach Information von medac

Rekombinant hergestellte Asparaginase zugelassen

Das Zytostatikum Asparaginase (Spectri-la®) wurde kürzlich als Bestandteil einer antineoplastischen Kombinationstherapie für die Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie (ALL) bei Kindern und Jugendlichen von der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren und bei Erwachsenen in Europa zugelassen. Der therapeutische Einsatz des Wirkstoffs ist in den deutschen Leitlinien ebenso wie in verschiedenen internationalen Therapieprotokollen zur Behandlung der ALL sowohl als Bestandteil der Induktionstherapie als auch der Konsolidationstherapie fest etabliert. *red.*

Nach Information von medac