Nachholbedarf in der Neutropenieprophylaxe

— Eine deutsche Umfrage verdeutlicht, dass in der leitlinienkonformen Neutropenieprophylaxe mit G-CSF weiterhin Nachholbedarf besteht. Dies gilt insbesondere für Chemotherapieregimes, bei denen ein intermediäres Risiko für das Auftreten einer febrilen Neutropenie besteht.

Hauptdomäne von G-CSF ist die Primärprophylaxe, die als Gabe dieses Wachstumsfaktors bei erwarteter febriler Neutropenie (FN) definiert ist. Leitliniengemäß ist eine solche Primärprophylaxe bei Chemotherapieregimes indiziert, die mit einem FN-Risiko von $\geq 20\%$ assoziiert sind. Bei Regimes mit niedrigerem Risiko wird eine individuell adaptierte Prophylaxe empfohlen, bei der patienteneigene, therapie- und tumorbedingte Risikofaktoren zu berücksichtigen sind. Helmut Ostermann, München, wies jedoch darauf hin, dass die Festlegung des FN-Risikos verschiedener Regimes in den Leitlinien nicht einheitlich ist.

Eine repräsentative Umfrage in Deutschland zeigt die Schwierigkeiten bei der

Neutropenieprophylaxe auf [Link H et al. Support Care Cancer 2016;24(1):367-76]. Etwa die Hälfte aller Patienten mit malignen Lymphomen, Lungen- oder Brustkrebs, die eine Chemotherapie mit intermediärem FN-Risiko erhielten, wurde nicht leitliniengerecht mit G-CSF versorgt, sondern entweder über- oder untertherapiert. Auf diesem Gebiet besteht demnach großer Nachholbedarf.

Dabei ist der Nutzen der Primärprophylaxe mit G-CSF-Präparaten wie dem lang wirkenden Lipegfilgrastim (Lonquex®) heute umfassend belegt. Laut einer Metaanalyse von 27 Studien wird das FN-Risiko durch die primärprophylaktische G-CSF-Gabe gegenüber Placebo um rund zwei Drittel reduziert [Wang L et al. Support Care Cancer 2015; 23(11):3131-40].

Katharina Arnheim

Lunchsymposium „Mehr Lebensqualität bei onkologischen Patienten durch therapiebegleitende Maßnahmen“, Deutscher Krebskongress, Berlin, 25. Februar 2016; Veranstalter: Teva

mCRC: EGFR-Hemmung auch im Alter möglich

— Etwa die Hälfte der Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC) sei bei Diagnosestellung bereits 70 Jahre oder älter, erläuterte Carsten Bokemeyer, Hamburg. Das Alter allein ist kein Grund, Patienten von einer wirksamen Therapie auszuschließen. Die Therapieentscheidung sollte sich auch beim mCRC eher nach der Fitness richten und bewährte Therapiekonzepte berücksichtigen.

Eine retrospektive Analyse der CRYSTAL-Studie belegt, dass ältere Patienten mit einem mCRC auch von der Addition des gegen den epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) gerichteten Antikörpers Cetuximab (Erbix®) zur Erstlinientherapie mit FOLFIRI (Folinsäure, 5-Fluorouracil und Irinotecan) profitieren. Von den 367 Studienteilnehmern mit einem Tumor mit RAS-Wildtyp waren 115 Patienten 65 Jahre und älter, wobei diese weniger häufig in einem sehr guten Allgemeinzustand waren und häufiger eine beeinträchtigte Lebensqualität aufwiesen als jüngere Studienteilneh-

mer. Trotz dieser Imbalance zeigte sich auch bei den älteren Patienten ein Trend zu einem Vorteil im Cetuximab-Arm bezüglich der Gesamtansprechrate (67,2 vs. 44,4%), des medianen progressionsfreien Überlebens (11,3 vs. 9,3 Monate) und des medianen Gesamtüberlebens (26,3 vs. 24,2 Monate). Dabei war das Sicherheitsprofil in beiden Studienarmen laut Bokemeyer auch bei den älteren Patienten vergleichbar.

Die Internationale Gesellschaft für Geriatrische Onkologie (SIOG) konstatierte wegen dieser und weiterer, diese Ergebnisse bestätigender, Studiendaten in ihren Therapieempfehlungen, dass ein Ausschluss von Cetuximab bei Patienten mit einem guten Allgemeinzustand wegen des Alters oder wegen Komorbiditäten nicht gerechtfertigt sei [Papamichael D et al. Ann Oncol. 2015; 26(3):463-76].

Friederike Klein

Symposium „Behandlung des mCRC heute – mehr als 08/15“, Deutscher Krebskongress, Berlin, 26. Februar 2016; Veranstalter: Merck Serono

mCRPC: Auf die Lebensqualität achten

Rund drei Viertel der Patienten mit einem Prostatakarzinom sind von einer Fatigue betroffen, die sehr belastend sein kann. Nun liegen Hinweise darauf vor, dass es diesbezüglich womöglich Unterschiede zwischen zwei Medikamenten gibt, die beim nicht oder mild symptomatischen, metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom nach dem Versagen der Androgendeprivationstherapie zum Einsatz kommen können [Dearden L et al. ISPOR. 2015; PCN237]. In einer internationalen Online-Befragung von 150 Teilnehmern gaben Patienten unter Abirateronacetat (Zytiga®) plus Prednison/Prednisolon im Vergleich zu Patienten unter Enzalutamid eine geringere Fatigue-Intensität und weniger Einschränkungen ihrer Lebensführung durch den chronischen Erschöpfungszustand an. Die Online-Befragung stützt die Ergebnisse der Studie COU-AA-301, in der Abirateronacetat die Fatigue bei mCRPC-Patienten nach dem Versagen von Docetaxel gegenüber Placebo (je plus Prednison/Prednisolon) deutlich verringern konnte. *red.*

Nach Informationen von Janssen-Cilag

Knochenmetastasen: Prävention von skelettbezogenen Komplikationen

65–75 % der Frauen mit Brustkrebs und der Männer mit einem Prostatakarzinom entwickeln Metastasen in den Knochen. Bei der Prävention von skelettbezogenen Komplikationen aufgrund solider Tumoren hat sich Denosumab (Xgeva®) bewährt. Dank der effektiven Osteoprotektion können damit auch durch Knochenmetastasen ausgelöste Schmerzen besser kontrolliert werden. Das zeigen Phase-III-Studien mit mehr als 5.700 Patienten mit Mammakarzinom, Prostatakarzinom oder anderen soliden Tumoren und Knochenmetastasen. Dabei zeigte sich insgesamt eine unter Denosumab deutlich um 8,2 Monate längere Zeitspanne ohne skelettbezogene Komplikationen. Das entspricht einer Risikoreduktion um 17 %. Denosumab verzögerte zudem bei verschiedenen Tumoren die Schmerzprogression deutlich gegenüber Zoledronsäure um 22 %, wodurch unter dem RANKL-Inhibitor seltener als unter dem Bisphosphonat eine Erhöhung des Analgetikabedarfs zu beobachten war. *red.*

Nach Informationen von Amgen