Kombinationen mit Bevacizumab bei mCRC

Die Zugabe von Bevacizumab zu etablierten Chemotherapieregimes kann für Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom die Ergebnisse verbessern. Aber welche Kombination ist die beste? In einer Phase-III-Studie wurden FOLFIRI plus Bevacizumab und mFOLFOX6 plus Bevacizumab verglichen.

Die Addition des Angiogenesehemmers Bevacizumab (Bev) zu dem Regime FOLFIRI (Folinsäure, Fluorouracil, Irinotecan) oder FOLFOX (Folinsäure, Fluorouracil, Oxaliplatin) erhöht die Wirksamkeit bei der Therapie metastasierter Kolorektalkarzinome (mCRC). Nur: Welche Kombination ist am effektivsten? Diese Frage sollte nun mithilfe einer Phase-III-Studie geklärt werden.

Im Rahmen der Studie erhielten therapienaive mCRC-Patienten randomisiert Bev gefolgt von FOLFIRI oder Bev gefolgt von mFOLFOX6. Primärer Studienendpunkt war die Nichtunterlegenheit von

FOLFIRI + Bev hinsichtlich des PFS. Sekundäre Endpunkte bildeten die Ansprechrate, das Gesamtüberleben (OS), Sicherheit und die Lebensqualität in den ersten 18 Monaten nach Therapiebeginn.

Von 395 der 402 Studienteilnehmer waren die Daten auswertbar. Das mediane PFS unter FOLFIRI + Bev ($n = 197$) lag bei 12,1 Monaten, das unter mFOLFOX6 + Bev ($n = 198$) bei 10,7 Monaten (Hazard Ratio [HR] 0,905, 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 0,723–1,133; $p = 0,003$ für Nichtunterlegenheit). Das mediane OS für FOLFIRI + Bev bzw. mFOLFOX6 + Bev betrug 31,4 bzw. 30,1 Monate (HR

0,990, 95%-KI 0,785–1,249). Die Raten für das beste Gesamtansprechen lagen bei 64 bzw. 62%.

Nebenwirkungen > Grad 3 waren u. a. Leukopenie (11 % unter FOLFIRI + Bev, 5 % unter mFOLFOX6 + Bev), Neutropenie (46 vs. 35 %), Diarrhö (9 vs. 5 %), periphere Neuropathie (0 vs. 22 %) und venöse Thromboembolie (6 vs. 2 %). Die Lebensqualität während der ersten 18 Monate war günstiger unter FOLFIRI + Bev.

Fazit: Als Erstlinientherapie bei mCRC-Patienten war FOLFIRI + Bev der Kombination aus mFOLFOX6 und Bev nicht unterlegen. Die Nebenwirkungen waren akzeptabel, die Lebensqualität war unter FOLFIRI + Bev besser. *Christina Berndt*

Yamazaki K et al. Randomized phase III study of bevacizumab plus FOLFIRI and bevacizumab plus mFOLFOX6 as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer (WJOG4407G). *Ann Oncol.* 2016;27(8):1539–46.

Rektumkarzinom: Mit der Operation nicht zu lange warten

Ergebnisse kleinerer Studien lassen vermuten, dass die Zeit zwischen der neoadjuvanten Radiochemotherapie (RCT) und der Operation für Patienten mit Rektumkarzinom eine Rolle spielt. Daten einer randomisierten Studie liefern nun weitere Informationen hierzu.

Hinsichtlich der Prognose von Patienten mit Rektumkarzinom schien es bisherigen Studiendaten zufolge günstig zu sein, nach der RCT 6–8 Wochen bis zur Operation zu warten. Nun wurde in einer Phase-III-Studie untersucht, ob

sich ein noch längeres Zeitintervall zwischen RCT und Operation positiv auf das pathologische Komplettansprechen (pCR) auswirkt.

253 Patienten mit Tumoren des mittleren oder unteren Rektums (cT3, T4

oder TxN+) wurden randomisiert entweder 7 oder 11 Wochen nach der RCT operiert. Der primäre Endpunkt war die pCR-Rate, definiert als ypT0N0-Biopsie.

Zwischen den beiden Gruppen bestand im primären Endpunkt kein signifikanter Unterschied (7 vs. 11 Wochen: 15,0 vs. 17,4 %; $p = 0,5983$) (**Abb. 1**). Jedoch war die Gesamtmorbidität in der 11-Wochen-Gruppe höher (44,5 vs. 32 %; $p = 0,0404$). Zudem war die Qualität der Mesorektumresektion in dieser Gruppe signifikant schlechter (vollständiges Mesorektum 78,7 vs. 90 %; $p = 0,0156$).

Fazit: Patienten mit Rektumkarzinom 11 anstelle von 7 Wochen nach der RCT zu operieren, verbessert die pCR-Rate nach der Resektion nicht. Längeres Abwarten ist womöglich mit einer höheren Morbidität und einer schwierigeren Resektion assoziiert. *Judith Neumaier*

Lefevre JH et al. Effect of Interval (7 or 11 weeks) Between Neoadjuvant Radiochemotherapy and Surgery on Complete Pathologic Response in Rectal Cancer: A Multicenter, Randomized, Controlled Trial (GRECCAR-6). *J Clin Oncol.* 2016; Jul 18. [Epub ahead of print].

Abb. 1: Der Zeitpunkt beeinflusste das pathologische Komplettansprechen (pCR) nicht.