Nichtkleinzelliges Lungenkarzinom: Neues Therapiespektrum in der Erstlinie

— Das Therapieregime Necitumumab plus Gemcitabin/Cisplatin bietet Patienten mit plattenepithelalem, nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) eine effektive neue Behandlungsoption in der Palliation.

Plattenepithelkarzinome bilden mit etwa 30% die zweitgrößte histologische Subgruppe des NSCLC. „Die meisten Tumorzellen exprimieren EGFR („epidermal growth factor receptor“); eine hohe Expression wird jedoch häufiger beim Plattenepithel- als beim Nichtplattenepithelkarzinom beobachtet“, erläuterte Wolfgang Schütte, Halle. Mit Necitumumab (Portrazza®) steht seit April 2016 erstmals eine zielgerichtete Therapie zur Erstlinienbehandlung von Patienten zur Verfügung, die an einem EGFR-exprimierenden, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten plattenepithelialen NSCLC leiden. In der offenen Phase-III-Studie SQUIRE hatten chemotherapienaive Patienten mit

EGFR-positivem plattenepithelalem NSCLC im Stadium IV unter Necitumumab in Kombination mit Gemcitabin/Cisplatin im Vergleich zu Gemcitabin/Cisplatin ein signifikant längeres Gesamtüberleben [Paz-Ares L et al. Ann Oncol. 2016;27(8):1573-9]. Dieser Vorteil betrug median 1,7 Monate (11,7 vs. 10,0 Monate; Hazard Ratio [HR] 0,79, 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 0,69–0,92; $p = 0,002$). Ein statistisch signifikanter Vorteil ergab sich auch hinsichtlich des medianen progressionsfreien Überlebens (5,7 vs. 5,5 Monate; HR 0,84, 95%-KI 0,72–0,97; $p = 0,018$).

„Patienten mit EGFR-positivem Plattenepithelkarzinom sollten daher den anti-EGFR-Antikörper als Add-on-Therapie angeboten bekommen“, riet Schütte. *Silke Wedekind*

Satellitensymposium „Das fortgeschrittene NSCLC: Fokus relevante Therapieoptionen“ anlässlich der DGHO-Jahrestagung, Leipzig, 14. Oktober 2016; Veranstalter: Lilly

Fortgeschrittenes Urothelkarzinom: Gutes Ansprechen unter Pembrolizumab in der Erstlinie

— Für Patienten mit lokal nicht sanierbarem oder metastasiertem Urothelkarzinom ist eine Cisplatin-haltige Chemotherapie derzeit die Behandlung der Wahl in der palliativen Erstlinie. Zurzeit gibt es noch keine zugelassenen Alternativen für Patienten, bei denen eine Behandlung mit Cisplatin keine Option ist. „In diesen Fällen beträgt die mittlere Überlebenszeit der Betroffenen nur noch neun bis zehn Monate“, ergänzte Markus Puhlmann, Rahway, NJ/USA.

In der offenen Phase-II-Studie KEYNOTE-052 wird zurzeit eine Therapiealternative für diese Behandlungssituation untersucht [Balar A et al. Ann Oncol. 2016;27(Suppl 6):LBA32_PR]. Die Studienteilnehmer erhielten Pembrolizumab (Keytruda®) in der Dosierung 200 mg alle drei Wochen entweder 24 Monate lang, bis zum Eintreten einer Krankheitsprogression oder bis zum Erreichen einer inakzeptablen Toxizität. „Die objektive Ansprechrates (ORR) betrug 24,0% und erreichte damit einen ähnlichen Wert wie Patienten unter Chemotherapie im

Praxisalltag“, berichtete Puhlmann. Um Patienten identifizieren zu können, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Behandlung ansprechen, wurde eine kombinierte PD-L1 („programmed cell death-ligand 1)-Expression in Immun- und Tumorzellen (CPS) von 10% oder mehr festgesetzt. Von den 30 der 100 analysierten Patienten, die dieses Kriterium erfüllten, sprachen 36,7% auf die Therapie mit dem Immuncheckpointinhibitor an, 13,3% erreichten eine Komplettremission. Bei den Patienten, die auf die Therapie angesprochen hatten, wurde die mediane Ansprechdauer noch nicht erreicht, bei 83% (20/24) betrug die Ansprechdauer sechs Monate oder länger.

„Pembrolizumab zeigt damit eine substanzzielle antitumorale Aktivität bei einem zugleich handhabbaren Sicherheitsprofil“, ergänzte Puhlmann. *Silke Wedekind*

Pressekonferenz „Immuno-Oncology: Advancing the Science“ anlässlich der ESMO-Jahrestagung, Kopenhagen, Dänemark, 10. Oktober 2016; Veranstalter: MSD Sharp & Dohme

Neue Dosierung von Abirateronacetat erhältlich

Die Arzneiform des Androgen-Biosynthese-Inhibitors Abirateronacetat (Zytiga®) wurde kürzlich weiter entwickelt, um die Einnahme für den Patienten noch angenehmer zu gestalten und so die Convenience zu erhöhen. Der Wirkstoff wird demnächst in einer neuen Formulierung zur Verfügung stehen: Patienten nehmen dann nur noch zwei anstelle von vier Tabletten einmal täglich für eine Tagesdosierung von 1.000 mg Abirateronacetat ein. Abirateronacetat war bislang als 250 mg Tablette verfügbar, empfohlen wird die Einnahme von 1.000 mg am Tag zusammen mit 10 mg Prednison oder Prednisolon, das weiterhin in einer Dosierung von zweimal täglich 5 mg eingenommen wird. Die neuen Tabletten enthalten 500 mg Abirateronacetat, sodass die Zahl der täglich einzunehmenden Tabletten von vier auf zwei halbiert werden kann. Bei der neuen Formulierung handelt es sich zudem um Filmtabletten, die aufgrund ihres glatten Überzugs für die Patienten leicht zu schlucken sein sollten. *red.*

Nach Information von Janssen-Cilag

G-BA veröffentlicht Bewertung zu Nivolumab plus Ipilimumab

Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Zusatznutzenbewertung für Nivolumab (Opdivo®) in Kombination mit Ipilimumab (Yervoy®) am 15. Dezember 2016 veröffentlicht. Darin sieht der G-BA bei nichtvorbehandelten Patienten mit einem fortgeschrittenen Melanom mit BRAF-Wildtyp aus formalen Gründen keinen Zusatznutzen für die erste zugelassene immunonkologische Kombination gegenüber einer Monotherapie mit Nivolumab oder Pembrolizumab. Der G-BA weicht dabei von seiner ursprünglichen Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie – einer Monotherapie mit Ipilimumab – ab. Seit Mai 2016 ist Nivolumab in Kombination mit Ipilimumab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem Melanom in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Die Zulassung basiert auf den Studien CheckMate-067 und CheckMate-069. Bristol-Myers Squibb ist von dem Nutzen des Therapieregimes überzeugt. „Die Entscheidung ist für uns absolut nicht nachvollziehbar“, so Han Steutel, München. *red.*

Nach Information von Bristol-Myers Squibb