Rezidivierende Hypoglykämien

Mittels Fastentest zur Diagnose

Rezidivierende Hypoglykämien bei einer Frau ohne bekannten Diabetes und in gutem Allgemeinzustand führten dank richtiger Verdachtsdiagnose schnell zum Pankreas als Krankheitsursache.

Bei einer 32-jährigen Patientin treten seit 8 Jahren rezidivierende Hypoglykämien auf, wobei ein Abfall der Blutzuckerwerte bis auf 30 mg/dl dokumentiert wurde. Diese Episoden gehen mit Vigilanzminderung, Schwäche, Zittern und Schwindel einher. Die Hypoglykämien treten gehäuft nachts oder vor dem Frühstück auf. Die klinische Untersuchung ist abgesehen von einem BMI von 30 kg/m² unauffällig. „Bei der differenzialdiagnostischen Abklärung einer Hypoglykämie muss vieles diskutiert werden“, wie Dr. Dilek Sadet von der Medizinischen Universitätsklinik in Frankfurt a.M. berichtet hat. Dabei sollte man sich auch vom klinischen Bild, also dem Allgemeinzustand, leiten lassen. Erscheint der Patient gut genährt und gesund, sollte vorrangig an Medikamente bzw. eine Hypoglycaemia factitia, ein Insulinom oder eine Mangelernährung gedacht werden. Bei Patienten mit einem schlechten Allgemeinzustand kommen auch eine Unterfunktion der Hypophyse, ein Morbus Addison, eine Niereninsuffizienz, eine Anorexie oder eine Glykogenspeicherkrankheit in Betracht.

Verdachtsdiagnose bestätigt sich

Da sich die Patientin in einem guten Allgemeinzustand befindet und nicht an Gewicht abgenommen hat, wird primär an ein Insulinom gedacht. Der Goldstandard zum Nachweis eines solchen ist der 72-h-Fastentest mit der Whipple's Trias: Niedriger Blutzucker bei erhöhten Werten von Insulin und C-Peptid. Dieser führt bei der Patientin dann in der Tat zu einem Blutzucker-

abfall auf 31 mg/dl mit entsprechender Symptomatik. Somit ist die Diagnose „Insulinom“ gesichert. Da die transabdominelle Sonografie keine ausreichend hohe Sensitivität bietet, sollte zur Lokalisationsdiagnostik ein Computer- oder Magnetresonanztomografie durchgeführt werden. Eine Angiografie kann aber ergänzend zur rein morphologischen Darstellung durchaus hilfreich sein, insbesondere bei atypischen Insulinomen. Therapie der Wahl ist immer die Operation. Nur bei inoperablem Patienten kann eine symptomatische Therapie mit Diazoxid durchgeführt werden. Selten ist das Insulinom Teil einer multiplen endokrinen Neoplasie (MEN); dann finden sich weitere endokrin aktive Tumoren im Bereich der Nebenschilddrüsen, des Duodenums (Gastrinom), der Hypophyse (Somatostatinom) oder des Pankreas (Glukagonom).

Dr. med. Peter Stiefelhagen

Fabula docet:

Bei rezidivierenden Hypoglykämien sollte nach Ausschluss einer medikamentösen Ursache immer an ein Insulinom gedacht werden. Der Goldstandard für die Diagnosestellung ist der 72-h-Fastentest mit der Whipple's Trias niedriger Blutzucker bei erhöhten Werten von Insulin und C-Peptid.

Quelle: Fallvorstellung von Dr. Dilek Sadet, Frankfurt a.M., im Rahmen der Herbsttagung der DDG, 11. November 2016 in Nürnberg.

Buchtipps

Psychische Auffälligkeiten bei Diabetes besser erkennen und verstehen

Dieses Buch schließt eine Lücke in der bislang erhältlichen deutschsprachigen Literatur zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus. Dabei bringt das Autorentrio vielfältige und langjährige Erfahrung aus der Kinderdiabetologie (Hilgard), Kinder und Jugendpsychiatrie (Meusers) und Kinderpsychologie mit Schwerpunkt Diabetologie (Bartus) mit. Die Autoren schaffen es, ein Buch für alle Betreuer von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes in gut verständlicher Sprache zu schreiben und strukturiert alle Aspekte des Diabetes und möglicher psychischer Folgen durch und für den Diabetes zu beleuchten. Nach einer ausführlichen Einleitung in den „Alltag“ eines Kindes oder Jugendlichen mit Diabetes und dessen

Familie, der besonders für Psychologen oder Kinder und Jugendpsychiater, die sonst wenig mit Diabetes zu tun haben, sehr hilfreich ist, folgen eine Einführung in psychologische und psychotherapeutische Behandlungsmethoden für den Kinderdiabetologen bzw. Berater. Neben der Entwicklungspsychologie nehmen auch ganz praktische Aspekte wie Versorgungsstrukturen in Deutschland, gesetzliche Vorgaben, entwicklungsorientierende Gesprächsführung und psychosoziale Anamnese großen Raum ein. Ausführlich wird auf einzelne psychiatrische Erkrankungen und deren Konsequenzen für den Diabetes und mögliche Therapiemethoden eingegangen. Den Abschluss bildet ein Kapitel zu besonderen Betreuungsbedingungen von Kindern psychisch kranker Eltern, diabetesskranker Eltern und Migranten. Insgesamt aus meiner Sicht ein gelungenes Buch, das in keinem kinderdiabetologischen Behandlungszentrum fehlen sollte.

PD Dr. med. Thomas M. Kapellen

Diabetes und psychische Auffälligkeiten; Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Verlag W. Kohlhammer, ISBN/Artikel-Nr.: 978-3-17-026856-2; 1. Aufl. 2016; Preis: EUR 49,00; 226 Seiten; Illustrationen: 6 Abb., 2 Tab.