Kardiovaskuläre Endpunktstudie

Gliflozin schützt Herz und Hirn, aber nicht Zehen

Fragestellung: Welchen Einfluss hat der SGLT2-Inhibitor Canagliflozin auf einen kombinierten Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod, nicht tödlichem Myokardinfarkt und nicht tödlichem Schlaganfall bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulärem Risiko?

Hintergrund: Canagliflozin reduziert bei Diabetikern Blutzucker, Blutdruck, Körpergewicht und Albuminurie. Das Canagliflozin Cardiovascular Assessment Program bestand aus zwei Schwesterstudien, in denen das Verhältnis von Nutzen und Risiko der Substanz untersucht wurde. In der ersten CANVAS-Studie wurde die kardiovaskuläre Sicherheit vor der Zulassung geprüft und in der zweiten (CANVAS-R) wurden nach der Zulassung auch renale Endpunkte wie Albuminurie einbezogen. Beide Studien wurden dann gemeinsam statistisch ausgewertet.

Dagegen waren mit 6,3 vs 3,4 Fällen/ 1000 Teilnehmer Amputationen unter Canagliflozin häufiger (HR 1,97). Davon betrafen 71% die Zehen oder Metatarsalia. Die mittlere Differenz der HbA_{1c}-Werte betrug -0,58 %, das Gewicht war mit Canagliflozin um -1,6 kg und der systolische/diastolische Blutdruck um -3,09/1,40 mmHg niedriger.

Schlussfolgerung: Die gemeinsame Auswertung der 2 Studien zeigte, dass bei Diabetikern mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko mit Canagliflozin weniger oft kardiovaskuläre Ereignisse auftraten als mit Placebo, aber auf Kosten häufigerer Amputationen.

– Kommentar von Prof. Dr. med. E. Fritschka

Weniger Apoplexie, das hat Gewicht

Die Studie befasst sich nur mit Diabetikern mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko. Die Ergebnisse können daher nicht auf alle Diabetiker generalisiert werden. Die tendenziell günstige Auswirkung auf die Schlaganfallhäufigkeit im Gegensatz zu anderen Studienergebnissen hat Gewicht [1]. Der protektive Einfluss auf den kombinierten kardiovaskulären und den renoprotektiven Endpunkt stimmt mit früheren Ergebnissen mit SGLT2-Hemmern überein [2]. Die positiven Effekte wurden hier durch die geringe Differenz der HbA_{1c}-Werte möglicherweise gar unterschätzt. Eine weitere Studie mit Canagliflozin bei Patienten mit nachgewiesener diabetischer Nephropathie ist unterwegs. Die erhöhte Rate von Amputationen in der Canagliflozin-Gruppe bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko wurde bisher mit anderen Gliflozinen nicht beobachtet. Canagliflozin sollte daher vorerst bei Patienten mit erhöhtem Risiko für Amputationen nur mit Vorsicht angewendet werden. Insgesamt zeigen die vorliegenden Studien bei Typ-2-Diabetikern mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko, dass unter Canagliflozin gegenüber Placebo, kombiniert betrachtet, signifikant weniger kardiovaskuläre Todesfälle und weniger nicht tödliche Infarkte sowie Schlaganfälle zu beobachten sind.

Literatur:

1. Wu JH, Foote C, Blomster J et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4:411-9
2. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:323-34

Originalie

Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):644–57.

Methoden: Teilnehmer waren 10.142 Typ-2-Diabetiker im Alter > 30 Jahren mit symptomatischen arteriosklerotischen Vorerkrankungen oder im Alter > 50 Jahre mit mehr als 2 starken kardiovaskulären Risiko-

faktoren und GFR > 30 ml/min pro 1,73 m². Das mittlere Alter betrug 63,3 Jahre; 36 % waren Frauen; die mittlere Diabetesdauer war 13,5 Jahre und 66 % hatten bereits kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Die Teilnehmer wurden auf Canagliflozin oder Placebo randomisiert und wurden im Mittel 188,2 Wochen beobachtet.

Ergebnisse: Der kombinierte primäre Endpunkt (kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt und nicht tödlicher Schlaganfall) wurde unter Canagliflozin signifikant weniger häufig (26,9 vs. 31,5 /1000 Patienten-Jahre, HR 0,86) erreicht, wenn auch die Komponenten einzeln ausgewertet im Vergleich zu Placebo nicht-signifikant seltener waren. Auch die Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz waren seltener (5,5 vs. 8,7, HR 0,67). Die Progression der Albuminurie war unter Canagliflozin geringer (89,4 vs. 128,7, HR 0,73). Der kombinierte renale Endpunkt (Abnahme der Nierenleistung um -40 %, Dialysepflicht oder renal bedingter Tod) trat unter Canagliflozin ebenfalls seltener auf (5,5 vs. 9,0, HR 0,6). Nur in der Placebo-Gruppe gab es 3 renalbedingte Todesfälle.

Prof. Dr. med. Emanuel Fritschka

Internist-Nephrologie-Hypertensiologe (DHL),
Sozialmedizin, Rehabilitationswesen,
Praxis für Innere Medizin
Bahnhofstraße 2, 97769 Bad Brückenau
praxis.fritschka@gmail.com