Mit Schlafstabilisierung gegen die Volkskrankheit Depression

— Der Melatoninagonist und 5 HT_{2C}-Antagonist Agomelatin (Valdoxan®) ist nicht nur antidepressiv wirksam, er kann auch die Schlaffeffizienz von Patienten mit Depression deutlich bessern. Ebenso ist die bei Therapie mit SSRI mitunter auftretende Affektverflachung („Emotional Blunting“) unter Agomelatin deutlich seltener zu verzeichnen. In seinem Vortrag „Monoaminerge und zirkadiane Therapiemechanismen – die Zeitmaschine in uns“ betonte Professor Göran Hajak, Chefarzt der Bamberger Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die gute Wirkung von Agomelatin auf den Schlaf-Wach-Rhythmus von Patienten mit Depression, der sehr häufig gestört sei. Laut den Ergebnissen einer 2011 veröffentlichten multizentrischen, randomisierten Doppelblindstudie mit 138 Patienten mit Depression habe Agomelatin bei vergleichbar guter Wirksamkeit den Schlaf-Wach-Rhythmus im Vergleich zu Escitalopram signifikant besser stabilisiert, so Hajak [1]. Dies sei etwa an der REM-Schlaf-Latenz abzulesen, die unter Behandlung mit Agomelatin im Vergleich zu Escitalopram deutlich geringer ausfiel. Unter Therapie mit SSRI tritt bei etwa 25 % der Patienten ein sogenanntes Emotional Blunting (eine emotionale Verflachung oder

Distanziertheit) auf. Im Vergleich zu Escitalopram schnitt Agomelatin in einer ebenfalls 2011 veröffentlichten Studien-Subgruppe [2] mit 66 Patienten mit Depression bezüglich der Affektverflachung deutlich besser ab. Nach 24 Wochen bejahten unter Agomelatin-Behandlung signifikant weniger Patienten die Aussagen „Meinen Emotionen fehlt Intensität“ und „Dinge, die mich vor meiner Krankheit beschäftigten, erscheinen mir nicht mehr wichtig“ (20 % bzw. 18 %) als unter Escitalopram (58 % bzw. 42 %). Frühere Studien mit deutlich höheren Fallzahlen hatten bereits die antidepressive Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo [3] beziehungsweise gegenüber SSRI und SNRI [4] gezeigt.

Heike Grosse

1. Quera-Salva MA et al. International Clinical Psychopharmacology; 2011; 26(5): 252–62
2. Corruble E et al. Europ Psychiatry 2011; 26 (Suppl 1): P02–24
3. Demyttenaere K Eur Neuropsychopharmacol 2011; (Suppl 4): 703–9
4. Kasper S et al. J Clin Psychiatry 2010; 71(2): 109–20

Satellitensymposium „Spektrum Depression: Differenzierung von Diagnostik und Therapie“, DGPPN-Kongress, 24.11.2011, Berlin
Veranstalter: Servier Deutschland

Immunglobulin-Therapie bei Immunneuropathien Mittel der Wahl

— Mit intravenösen Immunglobulinen, Kortikosteroiden und/oder Plasmaseparation sind rund 70 % der Patienten mit chronisch-inflammatorisch demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) behandelbar. Dabei sind Immunglobuline die Therapie der Wahl. Dies beruht auf den Daten der multinationalen ICE-Studie (IGIV-C CIDP Efficacy), wie Professor Bernd Kieseier, Düsseldorf, berichtete, und führte zur Zulassung durch die europäische Zulassungsbehörde für das Immunglobulin Gamunex® 10 % für die CIDP in mehreren europäischen Ländern einschließlich Deutschland. Die ICE-Studie war die erste randomisierte, doppelblinde Studie zur intravenösen Gabe von Immunglobulinen in der Kurz- und Langzeittherapie von Patienten

mit CIDP. Geprüft wurde der Effekt auf den Behinderungsgrad im Vergleich zu Placebo. Im Verumarm nahmen 59 Patienten teil, im Placeboarm 58 Probanden. Die Erhaltungsdosis betrug 1 g/kg KG alle drei Wochen, verabreicht jeweils über ein bis zwei Tage mit einer Gesamtbehandlungsdauer von bis zu sechs Monaten. Für die Responder folgte eine Extensionphase von sechs Monaten. Primärer Endpunkt war die Ansprechratenach 24 Wochen. Sie zeigte klare Vorteile für die Verumgruppe. So sprachen insgesamt 54 % der mit IgG behandelten Teilnehmer darauf an – ein signifikant höherer Anteil als in der Placebogruppe, in der die Rate nur 21 % betrug ($p < 0,001$; [1]). Dies führte ebenfalls zu einer deutlich besseren Lebensqua-

Kramer-Pollnow-Preis verliehen

Professor Stephan Bender, Dresden, ist mit dem Kramer-Pollnow-Preis 2011 ausgezeichnet worden. Die Arbeitsgruppe um Bender konnte nachweisen, dass die motorische Hyperaktivität bei ADHS nicht allein von einer allgemeinen Reifungsverzögerung verursacht wird, sondern dass zusätzlich Defizite bei der Steuerung des motorischen Systems in Form einer mangelhaften Hemmung im Gehirn vorliegen. Der von der Medice Arzneimittel Pütter GmbH unterstützte Forschungspreis wird alle zwei Jahre für besondere wissenschaftliche Leistungen in der klinischen Forschung zur biologischen Kinder- und Jugendpsychiatrie verliehen und ist mit 6.000 Euro dotiert. *red*

Nach Informationen von Medice

Umfrage zu Ängsten

Laut einer repräsentativen Online-Befragung von 1.050 Erwachsenen leidet fast jeder Vierte häufig unter Angst- und Unruhezuständen. Hintergrund sind demnach fast immer persönliche Lebensumstände. Viele Befragte haben Angst vor einer womöglich wesensverändernden und die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Psychopharmakatherapie. Im Dilemma zwischen Leidensdruck und Therapieangst sind laut Umfrage die meisten bereit, pflanzliche Medikamente auszuprobieren, wenngleich die Erwartungshaltung, insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit solcher Präparate, begrenzt ist. Das seit 2010 zugelassene Arzneimittel Lasea® mit dem pflanzlichen Inhaltsstoff eines speziellen Lavendelöls (Silexan®/ WS® 1265) kann hier eine Therapieoption für Patienten mit Angst- und Unruhezuständen sein. *red*

Nach Informationen der W. Spitzner
Arzneimittelfabrik GmbH

Bipolare Störung

In den interaktiven Fortbildungen „Auf Visite mit Dr. B. Polar“ von Lilly wird Ihnen in kurzen Filmen das Atypikum Zyprexa® zur Behandlung bipolarer Störungen vorgestellt. Dr. B. Polar bittet Sie um Unterstützung bei Patienten mit bipolarer Erkrankung. Reisen Sie gemeinsam virtuell zum Patienten und behandelnden Arzt und beraten Sie, was zu tun ist, um eine dauerhafte Stimmungsstabilisierung zu erreichen (www.lillyfortbildung.de). *red*

Nach Informationen von Lilly