onstest verwendet, der knapp eine Stunde dauert und neben dem Wortschatz und den mathematischen Fähigkeiten auch die visuell-kognitive Leistung überprüft. Das Gesamtergebnis wird auf einer 9-Punkte-Skala abgebildet – im Mittel erreichen junge Erwachsene dabei 5,0 Punkte. Zugleich fahndeten die Forscher um Cortese in MS-Registern nach männlichen Patienten der entsprechenden Jahrgänge. Auf diese Weise konnten sie die Musterungsergebnisse von 922 Männern ermitteln, die später an MS erkrankten. Diese verglichen sie nun mit den Resultaten von knapp 20.000 Männern ohne MS.

Sechs IQ-Punkte schlechter

Auf den ersten Blick gab es keine kognitiven Unterschiede zwischen Männern, die später an MS erkrankten, und solchen, die gesund blieben (4,9 vs. 5,0 Punkte im Gesamtscore). Ein anderes Bild offenbarte sich den Forschern jedoch, wenn sie schauten, an welcher MS-Form die Patienten litten und wie lange die Musterung zurücklag: Bei Männern, die ein bis zwei Jahre nach dem Kognitionstest an einer schubförmigen MS erkrankten, waren die Ergebnisse in der Tat signifikant schlechter (4,2 Punkte, $p = 0,001$). „Der Unterschied entspricht in etwa sechs IQ-Punkten“, erläuterte Cortese.

Deutlich werden die Differenzen auch bei einer anderen Betrachtungsweise: Im Schnitt lagen rund 20 % aller Männer beim Kognitionstest eine Standardabweichung unterhalb des Durchschnittswertes von 5,0 Punkten. Von denjenigen, die ein bis zwei Jahre nach der Musterung eine MS-Diagnose bekamen, waren es jedoch doppelt so viele (40,5 %). Kognitive Defizite scheinen nach diesen Daten bei nicht wenigen Patienten einer MS-Diagnose vorauszugehen. „Eine kognitive Beeinträchtigung könnte daher ein MS-Frühsymptom sein“, so die Gesundheitsforscherin.

Noch deutlicher wird dies bei der primär-progredienten MS. Hier konnten die Wissenschaftler von 110 Patienten Daten zum Kognitionstest bei der Musterung auswerten. Diejenigen, die in den ersten zehn Jahren nach dem Test an einer primär-progredienten Form der MS erkrankt waren, hatten beim Test

nur rund 4 Punkte erreicht, wer 10 bis 20 Jahre danach erkrankte, lag mit 4,5 Punkten ebenfalls noch signifikant unter dem Durchschnitt. Nach diesen Ergebnissen müsste man also davon ausgehen, dass sich eine primär-progrediente MS bereits zehn bis 20 Jahre vor der Diagnose mit kognitiven Beeinträchtigungen bemerkbar macht.

Sieht man bei Diagnosestellung nur die Spitze des Eisbergs?

Inzwischen glauben viele Experten, dass bei der Diagnose einer primär-progredienten MS-Form nur die Spitze des Eisbergs sichtbar wird. Wenn die Patienten klinisch auffällig werden, haben sie offenbar über Jahre hinweg massive neuronale Schäden angehäuft. Möglicherweise beginnt also eine primär-progrediente MS im Schnitt nicht zehn Jahre später als eine schubförmige MS, sondern wird aufgrund ihres Verlaufs nur viel später erkannt. Auch hier könnten kognitive Beeinträchtigungen ein erstes Warnsignal sein. Allerdings sollten die norwegischen Registerdaten mit Vorsicht interpretiert werden. So gab es nur 42 Männer, die in den ersten ein bis zwei Jahren nach der Musterung an einer schubförmigen MS erkrankten, und 64, bei denen in den ersten 20 Jahren eine primär-progrediente MS festgestellt wurde. Die Annahme, dass sich eine MS schon Jahre im Voraus über kognitive Beeinträchtigungen bemerkbar macht, basiert also auf einer recht überschaubaren Zahl von Personen.

Schlechtere Werte auch bei der körperlichen Leistung

Auffällig ist, dass spätere MS-Patienten auch bei den körperlichen Musterungsuntersuchungen schlechter abschnitten als der Durchschnitt. Hier gab es jedoch keinen zeitlichen Zusammenhang mit der MS-Diagnose. „Offenbar hat das nichts mit einer beginnenden MS zu tun, vielmehr scheinen MS-Risikofaktoren mit einer schlechteren körperlichen Fitness einherzugehen“, vermutet Cortese.

Thomas Müller

Parallel Session 7: Will MS be prevented?
31. ECTRIMS-Kongress, Barcelona, 7. – 10.10.2015

Bessere kognitive Fähigkeiten durch Vitamin D?

Etwa die Hälfte der MS-Patienten sind von kognitiven Störungen betroffen. Besonders häufig treten diese im Bereich der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit sowie der visuell episodischen Gedächtnisleistung auf. Intelligenz und Sprachfunktionen bleiben hingegen meist erhalten. Aufgrund der vielseitigen auch sozialen Konsequenzen, die kognitive Defizite nach sich ziehen, kommt der Bestimmung der kognitiven Leistungsfähigkeit mittlerweile eine größere Bedeutung zu.

Vitamin D zählt zu den Umweltfaktoren, welche die MS-Pathogenese zu beeinflussen scheinen. Ob es auch einen Einfluss auf die kognitiven Funktionen bei MS-Patienten ausübt, untersuchte die Arbeitsgruppe von Professor Hala Darwish von der American University of Beirut [H. Darwish et al. ECTRIMS 2015, Abstract 129]. Insgesamt 88 MS-Patienten wurden abhängig von ihrem Vitamin-D-Wert in eine Gruppe mit niedrigen Vitamin-D-Werten ($^{25}(\text{OH})\text{D} < 25 \mu\text{g/ml}$) und eine mit Normalwerten ($> 35 \mu\text{g/ml}$) aufgeteilt. Teilnehmer mit niedrigem Vitamin D wurden drei Monate lang mit 10.000 IU täglich supplementiert. Zu Beginn der Studie und drei Monate nach der Supplementierung wurden die kognitiven Fähigkeiten anhand des Arabic-Montreal Cognitive Assessment (MoCA), des Stroop-Tests, des Symbol Digit Modalities-Tests (SDMT) und des Brief Visual Memory Test delayed recall (BVRT-DR) ermittelt.

Bei der ersten Testrunde zeigte die Gruppe mit niedrigem Vitamin-D signifikant schlechtere Werte im SDMT und BVRT-DR (n. s. im MoCA) nicht jedoch im Stroop-Test. Die EDSS-Werte lagen bei Patienten mit niedrigen Vitamin-D-Werten höher ($1,6 (\pm 1,1)$ vs. $1,1 (\pm 0,9)$; $p = 0,04$). Drei Monate nach der Supplementierung fand sich ein signifikanter Unterschied beim BVRT-DR (normales Vitamin D: $9,4 (\pm 2,9)$ versus niedriges Vitamin D: $7,8 (\pm 3,9)$; $p < 0,04$).

Laut Darwish sind drei Monate Nachbeobachtungszeit möglicherweise zu kurz, um in allen Tests einen statistisch signifikanten Unterschied zu erreichen.

Dr. Marion Hofmann-Aßmus

31. ECTRIMS-Kongress, Barcelona,
7. – 10.10.2015