G. MALORNY, N. RIETBROCK u. H.-H. SCHASSAN (Hamburg): Über den Stoffwechsel des Trimethylaminoxids

Trimethylaminoxid (TMAO) kommt in zahlreichen Seefischarten und Meerescrustaceen vor. Es ist das Entgiftungsprodukt des Trimethylamins (TMA) und wird offenbar vom Fisch, ähnlich wie der Harnstoff, wegen seiner osmoregulatorischen Wirksamkeit gegen den hohen Salzgehalt des Meerwassers retiniert. Der TMAO-Gehalt der Seefische schwankt zwischen 0,4–1,5 g/100 g Fisch.

Abbau und Entgiftung des TMA können im Organismus auf zwei Wegen erfolgen:

1. Durch N-Demethylierung. Hierbei entsteht durch schrittweise Abspaltung der biologisch labilen Methylgruppen Formaldehyd (FA), der anschließend in Ameisensäure (AS) übergeht.

2. Durch N-Oxydation. Bei Hund und Katze ist die Reversibilität der Reaktion $\text{TMA-N-Oxyd} \rightleftharpoons \text{TMA}$ nachgewiesen. Der Mensch scheidet nach LINTZEL (1934) verabfolgtes TMA fast quantitativ als TMAO aus.

Bei Verfütterung von frischem, nicht konserviertem Seefisch (Ostseedorsch, Kabeljau) scheiden Hunde und Katzen im Urin FA und AS aus. Im Mittel von 48 Versuchen eliminieren z.B. Katzen nach Kabeljauverfütterung täglich 7,2 mg Gesamt-FA und 82,0 mg AS; gleichzeitig ist die Harnmenge verdreifacht. Nach Verfütterung von Süßwasserfisch (Karpfen) findet man im Urin der Katze nur 5% der nach Kabeljauernährung bestimmten FA-Menge und nur 3% der AS. Da der Karpfen nur Spuren von TMAO und der Kabeljau 430 mg/100 g enthält, ist als Quelle für die Ausscheidung von FA und AS das TMAO des Fischfleisches anzunehmen.

Von besonderer Bedeutung ist der Befund, daß im Homogenat normaler Kabeljaumuskulatur nebeneinander FA und AS vorhanden sind (im frischen Zustand: 8,7 mg/kg FA und 40 mg/kg AS). Nach dreitägiger Lagerung nimmt der Gehalt an FA auf die Hälfte ab und an AS entsprechend zu. Diese Veränderungen werden offenbar durch fischeigene bzw. bakterielle Enzyme hervorgerufen, die einen Teil des TMAO spalten.

Nach intraperitonealer Gabe von reinem TMAO (200–500 mg/kg) wird bei Kaninchen und Katzen in den ersten 3 Tagen FA ausgeschieden; die AS-Elimination hält bis zum 7. Tage an. Nach oraler Verabfolgung von TMA an Katzen lassen sich im Urin ebenfalls FA und AS nachweisen.

Durch diese Versuche ist der Beweis erbracht, daß FA und AS in natürlichen Lebensmitteln vorkommen und mindestens im Seefisch keine Fremdstoffe darstellen.

Prof. Dr. G. MALORNY, Pharmakologisches Institut der Universität,
2 Hamburg 20, Martinistr. 52