

448 P. E. BECKER und F. KIENER: Eine neue x-chromosomale Muskeldystrophie.

Human Genet. **3**, 111 (1951). — ¹⁵ STEVENSON, A. C.: Muscular dystrophy in Northern Ireland. Ann. of Eugen. **18**, 50 (1953/54). — ¹⁶ TYLER, FRANK H., and F. E. STEPHENS: Studies in disorders of muscle. II. Clinical manifestations and inheritance of facioscapulohumeral dystrophy in a large family. Ann. Int. Med. **32**, 640 (1950). — ¹⁷ WALTON, J. N., and F. J. NATTRASS: On the classification, natural history and treatment of the myopathies. Brain **77**, 170 (1954).

Prof. Dr. med. P. E. BECKER, Tuttlingen, Königstr. 18
und Dr. phil. F. KIENER, Tegernheim b. Regensburg.

Berichtigung

zu Beitrag: Zur Sterblichkeit der Morphinisten. Von EDITH RÜDIN,
Arch. f. Psychiatr. u. Z. Neur., Bd. 193, S. 98—166.

In der Tabelle 5, S. 104, wurden die Zahlenreihen der Spalten 8 und 9 miteinander vertauscht. Die Zahlenreihe der Spalte 8 stellt also die Sterblichkeit der Manisch-Depressiven dar, die Zahlenreihe der Spalte 9 die Sterblichkeit der bayerischen Gesamtbevölkerung.