11.d. Operative Versorgung dislozierter intraartikulärer Frakturen**G. BÖTTGER, B. FRIEDRICH und R. ZWIRNER (a.G.)**Chirurgische Universitätsklinik Würzburg
(Direktor: Prof. Dr. E. Kern)

Bei der Wiederherstellung dislozierter intraartikulärer Frakturen ergeben sich häufig schwierige Fragestellungen. In den meisten Fällen führt ein konservatives Vorgehen zu unbefriedigenden Resultaten. Aber auch die operativen Methoden haben oft ihre besondere Problematik. Dies trifft vor allem für die Frakturen zu, wo es zu Zerstörungen der Gelenkfläche oder zu flachen schalenförmigen Abrissen knorpeltragender Gelenkanteile gekommen ist, die mit keiner Metallosteosynthese stabil fixiert werden können.

1. Der flache schalenförmige Abriß bei der Luxationsfraktur des Oberarmkopfes. In diesen Fällen wird vorgeschlagen, das abgetrennte dislozierte Fragment mit Knochennägeln von der Gelenkfläche her auf dem Schaftfragment zu fixieren. Wir benutzten homoioplastische Knochenkantkeilnägeln von 6—8 cm Länge aus der Knochenbank.

2. Die Zerstörung und Impression der Gelenkfläche bei Tibiakopffrakturen. In Frage kommen entweder die mosaikförmige Zusammensetzung der Gelenkfläche — mit eventueller Reimplantation und Fixierung von Knorpelknochenfragmenten vom Gelenk her — nach Hebung des Condylus und Unterfütterung mit Spongiosachips oder der Ersatz der zerstörten Gelenkfläche durch freie Transplantation oder Teiltransplantation der gleichseitigen Patella.

3. Die Wiederherstellung einer imprimierten Talusgelenkfläche nach den gleichen Prinzipien.

4. Die Rekonstruktion der Gelenkpfanne nach Luxationsfrakturen des Hüftgelenks mit Abrissen des Pfannendaches mit Hilfe von Schrauben oder Knochennägeln.

Wesentlich ist die Erreichung einer anatomischen Wiederherstellung der Gelenkflächen ohne Stufenbildung, da schwerste sekundäre Arthrosen sonst unausbleiblich sind.

12. Nagelung pertrochanterer Brüche mit dem Trochanternagel**W. HARTL**Chirurgische Klinik rechts der Isar der Technischen Hochschule München
(Direktor: Prof. Dr. G. Maurer)

Unter den bekannten Verfahren zur Osteosynthese von Frakturen im Trochanterbereich bietet die Nagelung mit dem Trochanternagel nach Küntscher wesentliche