In einer Reihe von Versuchen, in denen bestimmte Bezirke des Tierkörpers durch Ligaturen ausgeschaltet wurden, wurde die Cl-Aufnahme lokalisiert. Zunächst wurde durch eine Haarligatur dicht hinter dem Kopf Aufnahme durch den Mund verhindert; diese Ligatur hat auf die Größe der Cl-Aufnahme keinen Einfluß; Aufnahme durch den Darmkanal spielt also jedenfalls keine Rolle. Dagegen verhindert eine Ligatur um das letzte Körpersegment die Cl-Aufnahme gänzlich.

Der endgültige Beweis dafür, daß die Analpapillen der Ort der parenteralen Cl-Aufnahme sind, wurde durch Versuche erbracht, in denen das Epithel der Analpapillen durch chemische Einwirkung zerstört wurde. Dieser Effekt wurde zunächst durch Vitalfärbung mit AgNO_3 (0,2%) erreicht, die das Epithel der Analpapillen tötet. So behandelte Larven fahren auch in $1/100$ -Ringerlösung fort, Cl zu verlieren. Sie sterben jedoch nach einigen Tagen ab, so daß zu befürchten ist, daß auch andere Gewebe — freilich weniger offensichtlich — geschädigt worden sind. Larven, deren Analpapillen durch kurzes (5 Minuten) Verbringen in 5% NaCl oder durch Abtrennen mit einer heißen Nadel getötet worden waren, entwickeln sich (etwas verzögert) weiter, zeigen jedoch ebenfalls keine Cl-Aufnahme mehr. Schließlich wurden noch von den 4 Analpapillen nur 2 durch eine Ligatur ausgeschaltet; hierdurch wurde die Cl-Aufnahme deutlich, aber nicht völlig abgedrosselt. Mit diesen Versuchen ist — wenigstens für *Culex*- und *Chironomus*larven — der Beweis erbracht worden, daß die Analpapillen der Ort der parenteralen Cl-Aufnahme sind.

Es ist wahrscheinlich, daß auch die Analpapillen anderer im Wasser lebender Insektenlarven parenteraler Ionenaufnahme dienen. Cl-Aufnahme aus dem Wasser fand KROGH auch bei den Larven von *Libellula*. Diese haben keine äußeren Analpapillen, aber entsprechende als „Rektalkiemer“ bezeichnete Gebilde im Inneren des Enddarms. Da deren Zellen sich wie die der Analpapillen mit AgNO_3 vital färben, ist wahrscheinlich, daß auch sie Ionengewinnung aus dem Wasser bewerkstelligen.

Von anderen Ionen wurde nur noch die Aufnahme von Br^- aus NaBr-Lösung geprüft. Es ergab sich, daß Br^- wesentlich langsamer aufgenommen wird, als Cl^- . Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu dem, was für die parenterale Ionenaufnahme anderer Tiere gilt, bei denen kein Unterschied zwischen der Aufnahme verschiedener Anionen gefunden wird. Zur Erklärung des Befundes muß entweder angenommen werden, daß der Mechanismus zur Anionenaufnahme der Insektenlarven in der Lage ist, zwischen Cl^- und Br^- zu unterscheiden, oder aber daß das eigentlich aktiv absorbierte Ion das Kation Na^+ ist, während die Anionen Cl^- und Br^- durch elektrostatische Kräfte ihm folgen; daß im letzteren Falle das beweglichere Cl^- rascher aufgenommen wird, erscheint verständlich. Die Annahme, daß Na^+ das Ion ist, auf dessen aktive Aufnahme die Analpapillen eingestellt sind, wird durch die Tatsache gestützt, daß von den Vitalfarbstoffen nur diejenigen, die wie Methylenblau selbst positiv geladen sind, durch die Analpapillen aufgenommen werden.

Somit ist erkannt, daß im Wasser lebende Insektenlarven in ihren Analpapillen ein Organ zur ziemlich raschen Absorption von Ionen auch aus stark verdünnter Lösung besitzen. Den biologischen Sinn dieser Fähigkeit könnte man zunächst in der Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks suchen. Es ist jedoch zu bedenken, daß der ziemlich hohe osmotische Binnendruck des Insektenkörpers zum großen Teil nicht durch Elektro-

lyte, sondern durch organische Körper, besonders Aminosäuren, bewirkt wird. Bei Verminderung des Gehaltes an Elektrolyten wird der osmotische Druck durch kompensatorische Vermehrung der organischen Stoffe aufrechterhalten. Hierfür besteht also keine dringende Notwendigkeit einer Ionengewinnung aus dem Medium. Es ist vielmehr anzunehmen, daß für den Stoffwechsel ständiger rascher Ersatz der unvermeidbar durch Abscheidungen und durch die Oberfläche verlorengehenden Ionen notwendig ist. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Beobachtung, daß bei Culiciden der Kot nach seiner Entleerung aus dem Darm ein Weilchen zwischen den Analpapillen festgehalten wird, ehe er endgültig abgestoßen wird; vielleicht hat dabei eine Rückresorption von Salzen stattgefunden.

Von verschiedenen Seiten ist die Beeinflussung der Größe (und auch Form) der Analpapillen durch den Salzgehalt des Mediums studiert worden. Verkürzung der Analpapillen fand sich besonders bei Culicidenlarven unter dem Einfluß von Na^+ . Die erwähnte schädigende Wirkung dieser Ionen auf die Analpapillen bewirkt offenbar eine Entwicklungshemmung. Bei Aufzucht von Culiciden in destilliertem Wasser hat oft erhebliche Vergrößerung der Analpapillen statt, und in Gewässern, die an Ionen extrem arm sind (z. B. Hochmooren, Almtümpeln), besitzen *Chironomus*larven monströse, keulenförmige Analpapillen. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß der Elektrolytarmut der Gewässer eine Vergrößerung der die Ionenaufnahme leistenden Oberfläche entgegenarbeitet. Interessant ist noch, daß bei Culiciden Vergrößerung der Analpapillen auch durch saures Medium erzielt werden kann und daß *Chironomus*larven mit Riesanalpapillen sich vorwiegend in sauren Gewässern finden. Offenbar erschwert saure Reaktion des Mediums die Ionenaufnahme.

Literatur.

H. KOCH, J. of exper. Biol. 15 (1938). — A. KROGH, Osmotic regulation in aquatic animals. Cambridge 1939. — F. PAGAST, Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. 56 (1936). — V. B. WIGGLESWORTH, J. of exper. Biol. 10 (1933); 15 (1938).

O. HARNISCH, Kiel.

Berichtigung

zu dem Aufsatz „Chromosomenstruktur“ von J. STRAUB in Naturwiss. 1943, H. 9/10, 97–108.

Da der Verfasser sich im Felde befindet, war es ihm nicht möglich, die Korrektur seines Beitrages selbst zu lesen. Dadurch sind einige Versehen unbemerkt geblieben.

In Fig. 1 muß es heißen: „Die 14 Chromosomen“ statt „Die 16 Chromosomen“.

In Fig. 4 fehlt die Bezeichnung der einzelnen Bilder. Es ist dargestellt: Oben links: Kern im Teilungszustand der frühen Prophase. Oben rechts: Kern im Teilungszustand der Spiralprophase. Mitte links: Kern im Teilungszustand der späten Prophase. Mitte rechts: Teilungsfigur der Metaphase. Unten links: Teilungsfigur der Anaphase. Unten rechts: Kern der Telophase bzw. Ruhekern.

Auf S. 107, linke Spalte, Zeile 18 und 25, muß es heißen: „positiven Ladungen“ statt „negativen Ladungen“ und in Zeile 27, 28, 35 „negativen Ladungen“ statt „positiven Ladungen“.