

Berichtigungen zu den Beiträgen der Flora von Salzburg.

(Oesterr. botanische Zeitschrift 1862. 12. Bd. Seite 305.)

Von Julius Hinterhuber.

- Thalictrum simplex* L. Wurde im Nassfelde von Mielichhofer und nicht von Dr. Sauter aufgefunden.
- Anemone baldensis* L. Kommt auf den Fuschertauern nicht vor, sondern wurde von Dr. Sauter ober der Ringalpe in der Fusch, und in der Zwing in Pinzgau gefunden.
- Ranunculus alpinus* L. Soll bei Maria Ellenberg in Schellenberg nicht Schallenberg heissen.
- R. arvensis* L. Kommt bei Wals bei Salzburg vor.
- R. pantothrix* DC. Allgemein in Lungau verbreitet Dr. Sauter.
- R. platanifolius* L. Ist nur eine Form von *Ranunculus aconitifolius*.
- R. pygmaeus* Wahlb. Wurde in der Zwing in Pinzgau von Herrn Bamberger aufgefunden.
- R. Traunfellneri* Hoppe. Dieser von Herrn Jelmelli auf der übergossenen Alpe aufgefunden, ist nicht der wahre, sondern nur eine Form von *R. alpestris* L.
- Helleborus foetidus* L. Wurde bei Mattsee nicht von Dr. Sauter, sondern von Herrn Pfarrer Michl aufgefunden.
- Aquilegia Einseleiana* Schultz. Ist nur eine Form von *Aquilegia pyrenaica* DC.
- Delphinium elatum* L. Wurde auf dem Scheidberg von Herrn Pfarrer Michl und nicht von Dr. Sauter aufgefunden.
- Fumaria Vaillantii* Lois. Kommt bei Salzburg in Gärten und nicht in Gräben vor.
- Barbarea stricta*. Andrz. Kommt nach Dr. Sauter auf feuchten Wiesen bei Leopoldskron vor.
- Arabis Turrata* L. Ist auf dem Neuhauserberge bei Salzburg nach Dr. Sauter zu streichen.
- Draba tomentosa* Wahlb. Soll heissen auf dem Eggerfürst nicht Churfürst. Ueberhaupt wurde der Standort Eggerfürst mehrfach mit Churfürst verwechselt.
- Thlaspi montanum* L. Soll heissen auf Aeckern in Lungau. Mielichhoffer.
- Subularia aquatica* L. Vor mehreren Jahren von Braune in einer Lache bei Grödig entdeckt. Wurde aber neuerer Zeit nicht mehr aufgefunden.
- Aethionema saxatile* R. Br. Kommt auf dem Kies des Rosittenbaches, am Fusse des Untersberges vor. Dr. Sauter.
- Viola palustris* L. Auf den Torfmooren bei Salzburg nicht selten. Dr. Sauter.

- Dianthus Armeria* L. Soll bei Eugendorf heissen.
- Silene excapa* All. Ist nur eine Form von *Silene acaulis* L.
- Facchinia lanceolata* Rb. Soll auf der Enskrachse bei Radstadt nicht Rudkrachse heissen.
- Arenaria Marschlinii*, wurde nicht von Dr. Sauter, sondern von Apotheker Traunsteiner aufgefunden.
- Elatine triandra*. Soll heissen am nicht in Zellersee.
- Hypericum veronense* Schr. Ist nur eine Form von *H. perforatum* L. Diese Pflanze wurde auch von Dr. Sauter bei Golling hinter der Kirche aufgefunden.
- Trifolium glareosum* Sch. Kommt nach Dr. Sauter allgemein auf Schutt von Gebirgsbächen vor.
- Vicia dasicarpa* Ten. Ist nur eine Form von *Vicia glabrescens* Koch, und kommt nach Dr. Sauter nicht selten in Getreidefeldern um Salzburg vor.
- Vicia pisiformis*, ist nach Dr. Sauter aus der Flora von Salzburg zu streichen.
- Potentilla norwegica* L. Kommt nach Dr. Sauter bei Lambach in Pinzgau vor.
- P. salisburgensis*. Soll Eggerfürst bei Hallein, nicht Churfürst bei Hallein heissen.
- Alchemilla fissa*. Soll ebenfalls Eggerfürst bei Hallein, nicht Churfürst bei Hallein heissen.
- Cotoneaster tomentosa* Lindl. Kommt auf einer Felswand auf dem Mönchberg bei Salzburg, nicht auf einer alten Mauer vor.
- Sempercivum arenarium* Koch. Ist nur eine Form von *Sempercivum hirtum* L.
- S. Funkii* Braune. Wurde der Standort sicherlich mit *Sempercivum Wulfenii* Hoppe verwechselt.
- Saxifraga Facchinii* Koch. Wurde auf dem Preber in Lungau von Vierhapper aufgefunden.
- S. retusa* Stbg. Wurde aufgefunden in der Fusch auf dem Schwarzkopf von Herrn Hofgärtner Schmid; auf dem Hoch-Golling in Lungau von Dr. Sauter.
- Helosciadium repens* Koch. Kommt nach Dr. Sauter auch bei Glas vor.
- Aster parviflorus* N. E. und *Aster salignus* Willd, sind aus der Flora zu streichen, und dafür *A. bellidiflorus* in den Auen an der Salzach bei Weitwörthen zu setzen. Dr. Sauter.
- Carpesium cernuum* L. An einem Hügel bei Laufen, nicht in den Auen an der Salzach. Birnbacher Curat.
- Artemisia campestris* L. Um Salzburg. Dr. Sauter.
- AchilleaCLUSIANA* Tausch. Auf dem Radstädter-Tauern. Hillebrand.
- Senecio alpinus* K. Auf dem Radstädter-Tauern. Zwanziger.
- S. incanus* L. Ist synonym mit *S. carniolicus* Willd.
- S. nebrodensis* L. Ist synonym mit *S. rupestris* Kit.
- Carlina longifolia* Rb. Kommt nach Metzler auch am westlichen Gehänge von Bockstein vor.

- Picris crepoides* Saut. Ist nur eine Form von *P. hieracioides*.
Leontodon nigricans Kit. und *Taraxacum nigricans* sind synonym.
Hieracium pilosellaeforme Hoppe ist synonym mit *H. Hoppeanum*
 Sch. Auf Bergmäder ober dem Bade Fusch. Dr. Sauter.
H. rigidum W. ist zu streichen, dafür aber an dessen Stelle *H.*
nemorosum Pers. anzusetzen.
Campanula thyrsoidea L. Auf einer Alpe im Mühlbachthale, ober
 Keprun in Ober-Pinzgau. Dr. Sauter.
Swertia perennis L. Auf dem Moore unter der Baderluck gegen
 Fuschel zu. Dr. Sauter.
Linaria Cymbalaria L. An benanntem Orte verwildert. Dr. Sauter.
Orobanche neotioides Saut. Am Gangsteige von St. Gilgen nach
 Feistenau im Walde, wie auch bei Abtenau. Dr. Sauter.
Or. pallidiflora Wimm. Ist synonym mit *O. Galii*. Dr. Sauter.
Or. procera K. Ist synonym mit *O. erubescens*. Dr. Sauter.
Or. Sauteri. Ist synonym mit *O. Cardui*. Dr. Sauter.
Galeopsis grandiflora Roth. Ist synonym mit *G. ochroleuca* Lam.
Lysimachia thyrsoiflora L. Bei Kasham neben der Strasse nach
 Pöllheim in einem Sumpfe. Dr. Sauter.
Anagallis tenella L. Bei Saalfelden zu streichen. Dr. Sauter.
Primula truncata Sch. Ist eine Form von *Pr. minima* L.
P. tyrolensis Schultz. Auf dem Tannengebirge Mielichh. Auf
 dem Bischof neben dem Hallstädter Schneeberge. Fehrenbach.
Rumex obtusifolius L. Allenthalben in Salzburg gemein. Dr. Sauter.
Potamogeton filiformis Pers. In einem künstlichen Sumpfe bei
 Abtenau. Neuerer Zeit nicht mehr aufgefunden. Dr. Sauter.
Najas major L. In Wassergräben bei Salzburghofen.
Lemna polyrrhiza L. In einer Lache bei Köttellack.
Allium montanum Schmd. Ist synonym mit *A. fallax* Don.
Carex maxima Scop. Ist synonym mit *C. pendula* Schreb.
C. Personii Sieb. Ist synonym mit *C. Gebhardi* Hoppe.

Salzburg, den 7. April 1863.

Correspondenz.

Bihar bei Grosswardein, den 10. September 1863.

Seit ich ihnen das letzte Mal schrieb, bin ich, und zwar seit 29. Juli hier in Bihar, nicht ganz 2 Meilen von Grosswardein, wohin ich auf einem kürzeren Wege reitend, in 1 Stunde gelangen kann. Bei mir besitze ich nur ganz kleine Partien meines Herbars, nämlich solche Gattungen, die ich fort und fort studiere, wie: *Sesleria*, *Colchicum*, *Iris*, *Muscari*, *Trifolium* etc. etc. — Doch reite ich beinahe täglich nach Grosswardein, um irgend im Herbar oder in Büchern etwas über Pflanzen, die mir gerade einfallen, nachzusehen. Die wichtigeren Floren