ist, muss sich der Ref. auf die Skizzirung einiger Punkte von allgemeinerem Interesse beschränken. Zwischen den verschiedenen Theorien über die Function des Stirnhirns bestehen z. Z. noch schroffe Gegensätze; auch die experimentellen Studien am Affen haben zu widersprechenden Resultaten geführt. Einigermassen sicher steht nur die Thatsache, dass im hinteren Theil des Stirnlappens, d. h. desjenigen Theiles des Grosshirns, der vor der Centralfurche gelegen ist, „motorische Centren“ für die Kopf- und Rumpfmuskeln vertreten sind. Nach einer eingehenden, durch zahlreiche und vorzügliche Abbildungen von Stirnhirnschnitten illustrierten Beschreibung des Stirnhirns, insbesondere seiner einzelnen Fasersysteme, betonen die Verfasser, dass „nicht besondere Abweichungen in der Architektonik, als vielmehr die eigenartigen Verbindungen der Frontallappen dieselben zu gesonderter Leistung befähigen“. Die Verf. ziehen aus gewichtigen anatomischen, physiologischen und klinischen Thatsachen, die auf innige Beziehungen zwischen Kleinhirn und Stirnhirn hinweisen, den berechtigten Schluss, dass im Stirnhirn eine Centralstätte des Grosshirns für das Cerebellum und zwar für das spezifische Kleinhirn-Sinnesorgan, nämlich die Bogengänge anzunehmen ist. Auf die Bedeutung des Stirnhirns für die Intelligenzleistungen beabsichtigen die Autoren in dem später folgenden klinischen Theil der Arbeit näher einzugehen.

Eduard Müller-Erlangen.

Berichtigungen.

I.

Von S. Goldflam-Warschau.

Bezugnehmend auf die neulich in der Deut. Zeitschr. f. Nervenhe. Bd. XXIII, H. 1 u. 2 erschienene Link'sche Arbeit (*Myasthenia gravis* mit Zellherden in zahlreichen Muskeln) gestatte ich mir den Thatsachen gemäss mitzutheilen, dass ich bereits im Jahre 1900 — die Laquer-Weigert'sche Mittheilung stammt aus dem Jahre 1901 — den ersten positiven mikroskopischen Befund eines in vivo excidirten Muskels durch Dr. M. Urstein in dessen Dissertation (*Ueber cerebrale Pseudobulbärparalyse*. Berlin 1900, S. 159—160) veröffentlichen liess; dieser Sachverhalt ist übrigens in meiner auch von Dr. Link citirten Arbeit (*Neurol. Centr.* 1902, Nr. 3—11) festgestellt.

II.

In dem Aufsatz Biro's „Ueber Epilepsie“ (Bd. XXIII, Heft 1 u. 2, S. 87 d. Z.) findet sich bei Besprechung der Opium-Bromkur als eine von mir ausgesprochene „Anschauung“ citirt, dass Opium einen „Krampfzustand der Musculatur der Blutgefässe“ hervorrufe. „Auf diese Weise werde der Organismus grösserer Flüssigkeitsmengen beraubt, und dies soll günstig einwirken.“

Ich bin mir nicht bewusst, eine solche oder ähnliche Anschauung irgendwo ausgesprochen zu haben und möchte zur Richtigstellung die ein-

zigen Sätze meiner vom Verf. citirten Arbeit (Ueber das Verhalten der Bromsalze im Körper der Epileptiker nebst Bemerkungen über den Stoffwechsel bei der Flechsig'schen Opium-Bromkur. Neurolog. Centralblatt 1897, Nr. 12), auf die sich vielleicht das Missverständniss des Herrn B. beziehen könnte, hier anführen.

„Bei mehreren Patienten, deren Flüssigkeitsstoffwechsel genau controlirt wurde, zeigte sich in der Opiumperiode eine auffällige Steigerung der Urinmenge (bei gleich bleibender Flüssigkeitszufuhr). — — — Am auffälligsten aber war, dass bei dem oben erwähnten Patienten, der vor der Behandlung jene typische präparoxysmelle Urinstauung gezeigt hatte, nach steigenden Opiumdosen jeder Einfluss des Paroxysmus auf die Urinmenge wegfiel. Es liegt die Erklärung nahe, dass die Urinstauung auf einem tonischen Krampf der Nierengefäßmuskulatur beruht, der dem eigentlichen Anfall nach Art einer Aura vorausgeht.“ — — — — „Indem nun das Opium auf die in Betracht kommenden Muskeln ähnlich wie auf die unwillkürlichen Muskeln des Darms lähmend wirkt, kann das sonst als secretionshemmend bekannte Mittel hier geradezu diuretisch wirken.“ — — Es wird dann weiter ausgeführt, dass man in dem oben erwähnten Fall, der auf Brom allein nicht, wohl aber auf Opium-Brom sich besserte, annehmen dürfe, dass das Opium durch seine krampflösende Wirkung auf die Nierengefäße einen Theil der mit dem Anfall einhergehenden Schädlichkeiten paralysirt habe. Der Schlusspassus lautet:

„Es wäre natürlich verfrüht, aus dieser einen Beobachtung allgemeine Schlüsse über das Wesen der Opium-Bromkur zu ziehen, zumal der angeführte Fall sicher nur für einen kleinen Bruchtheil der Epileptiker typisch ist.“

Hieraus mag der Leser selbst meine Anschauung über die Opiumwirkung entnehmen.

Alsbach bei Darmstadt, 28. I. 03.

Dr. Rudolf Landenheimer.